



¡PADRES!



Proteja su niño contra estas serias enfermedades, que pueden causar ceguera, sordera, daño cerebral y hasta la muerte...

Hepatitis B

Sarampión

Hepatitis A

Polio

Paperas

Meningitis

Tétano

Rubéola (Sarampión Alemán)

Rotavirus

Difteria

Varicela

Haemophilus influenzae tipo b

Tos ferina

Neumocócica

Influenza

Las vacunas...




- Protegen contra estas enfermedades
 - Ayudan a su niño desarrollar inmunidad sin la enfermedad
 - Se requieren para que su niño entre la escuela y a centros de cuidado diurno

“Comience las vacunas de su niño a tiempo y manténgalo en el calendario.”



Consulte con el médico de su niño para obtener información donde vacunar a su niño,
Llame al 311 ó visite nyc.gov/health

ITINERARIO PRE-ESCOLAR RECOMENDADO DE INMUNIZACIÓN, ENERO 2010

	NACIMIENTO	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES	4 - 6 AÑOS
Hepatitis B HepB	√	√		√ 6-18 meses			
Difteria, Tétano, Pertussis DTaP		√	√	√		√ 15-18 meses	√
Haemophilus influenzae tipo b Hib		√	√	√	12-15 meses	√	
Polio IPV		√	√	√ 6-18 meses			√
Neumocócica PCV		√	√	√	√ 12-15 meses		
Rotavirus RV		√ 6-12 semanas	√	√ ≤32 semanas			
Sarampión, Paperas, Rubéola MMR					√		√
Varicela Var					√		√
Hepatitis A HepA					2 dosis 12-23 meses	La segunda dosis debe ser administrada seis meses después de la primera dosis	
Influenza (Gripe)				Niños menores 9 años, necesitan 2 dosis de Flu en el primer año de vacunarse			
H1N1 Gripe				Niños menores de 9 años necesitan 2 dosis de H1N1. Dar la segunda dosis tres semanas después el primera dosis			
Meningococcal MCV4						Niños mayores de 2 años y en grupos de alto riesgo	



IMM 43 (05/10)



Bureau of Immunization