

¿Qué tengo que saber acerca de estas medicinas?

- Inscríbase en la Terapia Directamente Observada (DOT), un programa gratis que le asignará un trabajador de salud personal para asegurarse de que usted está mejorando.
- Debe tomarse TODAS sus medicinas tal y como fueron recetadas. Si no se toma las medicinas todos los días, se puede enfermar de nuevo. Los gérmenes de la TB pueden volverse resistentes a las medicinas y por tal razón más difíciles de matar.
- No tome Tylenol, y NO consuma bebidas alcohólicas mientras esté tomando estas medicinas.
- Informe a su médico y enfermera/o si está tomando otras medicinas (incluyendo hierbas medicinales) o vitaminas. Otras medicinas pueden afectar la manera en que operan las medicinas de la TB.

¿Voy a sufrir efectos secundarios con estas medicinas?

Algunas personas pueden tener algunos de los efectos secundarios abajo mencionados. (Usted puede estar tomando alguna medicina para la TB que no está mencionada en esta tarjeta.)

Isoniazid (INH, Laniazid, Niazid, Nydrazid)

- Náusea
- Pérdida de apetito
- Vómitos
- Pies o manos insensibles
- Orina oscura
- Piel y ojos amarillentos
- Sarpullido

Rifampin (Rifadin)

- Náusea
- Moretones por pequeñas lesiones
- Sarpullido
- Vómitos
- Síntomas de gripe
- Fiebre
- Pérdida de apetito

*La rifampicina puede causar que los fluidos de su cuerpo (incluyendo la orina, el sudor y/o las lágrimas) se tornen anaranjados ó rojos, manchando permanentemente los lentes de contacto. Esto no le hace daño a usted.

Pyrazinamide

- Náusea
- Pérdida de apetito
- Sarpullido
- Vómitos
- Piel y ojos amarillentos
- Orina oscura
- Dolores en las articulaciones

Ethambutol (Myambutol)

- Visión borrosa
- Cambio de color en la visión

Si tiene alguno de estos efectos secundarios **deje de tomar las medicinas**, e informe **inmediatamente** a su médico, enfermera/o o su trabajador público de salud (PHA). Para más información, llame al 311 o visite nuestra página web: nyc.gov/health

¿Qué tengo que saber acerca de estas medicinas?

- Inscríbase en la Terapia Directamente Observada (DOT), un programa gratis que le asignará un trabajador de salud personal para asegurarse de que usted está mejorando.
- Debe tomarse TODAS sus medicinas tal y como fueron recetadas. Si no se toma las medicinas todos los días, se puede enfermar de nuevo. Los gérmenes de la TB pueden volverse resistentes a las medicinas y por tal razón más difíciles de matar.
- No tome Tylenol, y NO consuma bebidas alcohólicas mientras esté tomando estas medicinas.
- Informe a su médico y enfermera/o si está tomando otras medicinas (incluyendo hierbas medicinales) o vitaminas. Otras medicinas pueden afectar la manera en que operan las medicinas de la TB.

¿Voy a sufrir efectos secundarios con estas medicinas?

Algunas personas pueden tener algunos de los efectos secundarios abajo mencionados. (Usted puede estar tomando alguna medicina para la TB que no está mencionada en esta tarjeta.)

Isoniazid (INH, Laniazid, Niazid, Nydrazid)

- Náusea
- Pérdida de apetito
- Vómitos
- Pies o manos insensibles
- Orina oscura
- Piel y ojos amarillentos
- Sarpullido

Rifampin (Rifadin)

- Náusea
- Moretones por pequeñas lesiones
- Sarpullido
- Vómitos
- Síntomas de gripe
- Fiebre
- Pérdida de apetito

*La rifampicina puede causar que los fluidos de su cuerpo (incluyendo la orina, el sudor y/o las lágrimas) se tornen anaranjados ó rojos, manchando permanentemente los lentes de contacto. Esto no le hace daño a usted.

Pyrazinamide

- Náusea
- Pérdida de apetito
- Sarpullido
- Vómitos
- Piel y ojos amarillentos
- Orina oscura
- Dolores en las articulaciones

Ethambutol (Myambutol)

- Visión borrosa
- Cambio de color en la visión

Si tiene alguno de estos efectos secundarios **deje de tomar las medicinas**, e informe **inmediatamente** a su médico, enfermera/o o su trabajador público de salud (PHA). Para más información, llame al 311 o visite nuestra página web: nyc.gov/health