

您的醫生開了異煙肼 (isoniazid)、或INH  
的處方，幫助您的身體抵抗結核菌。

## 有關INH的知識

Michael R. Bloomberg, 市長 Thomas R. Frieden, MD, MPH, 局長

紐約市健康與心理衛生局  
結核病防治部門



每次預約看病一定要去，如果有任何問題，請給中心打電話。

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 胸科<br>中心<br>地址<br>和電話 |  |
|-----------------------|--|

更多詳情，請撥打311，或者  
訪問我們的網站 [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health)。

Facts About INH (Chinese)

03/05

您的醫生開了異煙肼 (isoniazid)、或INH  
的處方，幫助您的身體抵抗結核菌。

## 有關INH的知識

Michael R. Bloomberg, 市長 Thomas R. Frieden, MD, MPH, 局長

紐約市健康與心理衛生局  
結核病防治部門



每次預約看病一定要去，如果有任何問題，請給中心打電話。

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 胸科<br>中心<br>地址<br>和電話 |  |
|-----------------------|--|

更多詳情，請撥打311，或者  
訪問我們的網站 [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health)。

Facts About INH (Chinese)

03/05

|            |
|------------|
| 姓名         |
| 開始服用INH的日期 |

- 您必須服用醫囑規定的**所有**藥物。
- 如果您忘記服用藥物，不要在第二天補服。每天服用的藥量決不要超過醫囑規定。
- 在服用INH時，避免服用泰諾(Tylenol®)。
- 在服用INH時，不要飲酒。

• 雖然INH是最好、最安全的抵抗結核菌的藥物之一，少數人還是有可能出現副作用。您需要當心的一些症狀包括：

- 噁心
- 嘔吐
- 尿色發暗
- 食欲不振
- 皮疹
- 手腳麻木
- 皮膚和眼睛發黃

如果您出現這些副作用中的任何一種，請**停止服用INH**，並**立即**告訴您的醫生、護士或者公共健康顧問(PHA)。

|            |
|------------|
| 姓名         |
| 開始服用INH的日期 |

- 您必須服用醫囑規定的**所有**藥物。
- 如果您忘記服用藥物，不要在第二天補服。每天服用的藥量決不要超過醫囑規定。
- 在服用INH時，避免服用泰諾(Tylenol®)。
- 在服用INH時，不要飲酒。

• 雖然INH是最好、最安全的抵抗結核菌的藥物之一，少數人還是有可能出現副作用。您需要當心的一些症狀包括：

- 噁心
- 嘔吐
- 尿色發暗
- 食欲不振
- 皮疹
- 手腳麻木
- 皮膚和眼睛發黃

如果您出現這些副作用中的任何一種，請**停止服用INH**，並**立即**告訴您的醫生、護士或者公共健康顧問(PHA)。