

ডায়াবেটিস কি?

যথন্ত্র আপনার ডায়াবেটিস থাকে, তখন আপনার খাদ্য থেকে পাওয়া শক্তিকে আপনার শরীর ব্যবহার করতে পারে না। আপনার শরীরে ইনসুলিন তৈরী হওয়ার এবং তা ব্যবহার করার একটা সমস্যা হয়। ইনসুলিন একটা হরমোন, যা আপনার শরীরকে রক্ত শর্করা(রাত সুগার) ব্যবহার করতে সাহায্য করে। দুরক্ষের ডায়াবেটিস আছে: টাইপ 1 এবং টাইপ 2।

- **টাইপ 1 ডায়াবেটিসে, আপনার শরীরের সামান্য বা কোন ইনসুলিন তৈরী হয় না।**
- **টাইপ 2 ডায়াবেটিসে, আপনার শরীরের সাধারণ ভাবে যদিও ইনসুলিন তৈরী হয়, কিন্তু আপনার শরীর তা ভাল ভাবে ব্যবহার করতে পারে না।**

দুই ধরণের ডায়াবেটিসেই রক্তে শর্করা জমা হয়, কারণ তা ব্যবহৃত হয় না। যেহেতু শর্করা রক্তের মধ্যে থেকে যায়, তাই, আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেশী হয়ে যায়। উচ্চ রাত সুগারের মাত্রা আপনার রক্ত নালী, এবং নার্ভগুলির ক্ষতি সাধন করতে পারে, এবং, দীর্ঘ দিন ধরে তা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার রাত সুগারের মাত্রা ঘতদূর সম্ভব স্বাভাবিকের কাছাকাছি রাখতে পারলে, আপনি এইগুলির ঝুঁকি কমাতে পারেন:

- ঢাকের সমস্যা
- কিডনির সমস্যা
- পা এবং পায়ের পাতার অ্যাস্প্রিনেশন (কেটে বাদ দেওয়া)
- যৌন সংক্রান্ত সমস্যা
- হার্ট আটাক এবং স্ট্রোক

গভীরস্থায় আপনার হাই রাত সুগার হলে গৰ্ভকালীন

(জেসচেশনাল) ডায়াবেটিস হয়। গভীরস্থায় মহিলাদের শরীরের পরিবর্তন হওয়ার জন্য জেসচেশনাল ডায়াবেটিস হয়। যদি আপনি গৰ্ভবতী হন, তাহলে আপনি আপনার ডাত্তারের সঙ্গে জেসচেশনাল ডায়াবেটিসের ব্যাপারে কথা বলুন।

টাইপ 1 ডায়াবেটিস

টাইপ 1 ডায়াবেটিস থাকা মোকদ্দের রাত সুগারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আবশ্যিক ভাবে ইনসুলিন নিতে হবে। সাধারণত, মানুষের যথন্ত বয়স কম থাকে, তখন তাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিস আরম্ভ হয়, কিন্তু যে কোন বয়সেই এটা হতে পারে।

টাইপ 1 ডায়াবেটিসের কারণের সঙ্গে যুক্ত আছে:

- পরিবারের মধ্যে টাইপ 1 ডায়াবেটিসের ইতিহাস
- শরীরের মধ্যের ইনসুলিন তৈরী হওয়ার কোষগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা

উপসংগ্ৰহ নি হচ্ছে:

- ত্রুটা বেড়ে যাওয়া
- প্রস্তাৱ বেড়ে যাওয়া
- ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া
- হঠাৎ ওজন হ্রাস
- অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করা

কিটোঅ্যাসিডোসিস একটি কঠিন সমস্যা, যা সাধারণত টাইপ 1 ডায়াবেটিস মোকদ্দের হয়। এটা হওয়ার কারণ যদি শরীর ইনসুলিন ব্যবহার করতে না পারে, তাহলে শরীর তার শক্তির জন্য রাত সুগারকে ব্যবহার করতে পারে না। এর পরিবর্তে শরীর চিরি ব্যবহার করে বজ্য তৈরী করে। যদি আপনি

কিটোঅ্যাসিডোসিস এর পর্যায় থাকেন, তাহলে আপনার হয়ত :

- স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ক্ষুধার্ত ও ত্রুটার্ত বোধ করতে পারেন
- বমি বা পেটব্যাথা করতে পারে
- শ্বাস প্রশ্বাসে ফলের গুরু পেতে পারেন
- গভীর ভাবে, এবং তাড়াতাড়ি শ্বাস প্রশ্বাস নেন
- জ্বর হতে পারে
- যদি আপনি প্রস্তাৱ পরিষ্কা করেন, দেখবেন, স্টোপের ওপর রঞ্চের পরিবর্তন হয়েছে
- রাত সুগারের মাত্রার পরিমাণ 240mg/dl বা তার বেশী

আপনার নিজে নিজে কিটোঅ্যাসিডোসিসের চিকিৎসা ঢেষ্টা করা

উচিত নয়! তাড়াতাড়ি ডাত্তারকে ডাকুন।

টাইপ 2 ডায়াবেটিস

যাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস আছে তাদের সঠিক খাদ্য পরিকল্পনা, ব্যায়াম, খাওয়ার ওষুধ, এবং/বা ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। টাইপ 2 ডায়াবেটিস, ধূৰ্বত সাধারণ ধরনের ডায়াবেটিস। যদিও এটা কম বয়সীদেরও হতে পারে, কিন্তু টাইপ 2 ডায়াবেটিস এদেরই বেশী হয় যাদের:

- বয়স 40 বছরের বেশী
- ওজন বেশী
- ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস আছে
- গভীরস্থায় ডায়াবিটিস ছিল
- 9 পাউন্ডেরও বেশী ওজনের বাচ্চা প্রসব হয়েছে
- অসুস্থতা অথবা দুঃটিনার কারণে চাপ আছে
- উচ্চ রক্তচাপ আছে
- আফ্রিকান আমেরিকান, ইল্পাহান আমেরিকান, অথবা বেটিভ আমেরিকান



উপসংগ্ৰহ নি হল:

- ক্লান্তি বোধ করা
- শুকনো এবং খসখসে চামড়া
- হাত ও পায়ে যত্ননা এবং অসাড় বোধ করা
- প্রায়ই সংক্রমণ হওয়া
- প্রস্তাৱ কৰা বেড়ে যাওয়া
- অস্পষ্ট দেখা
- যৌন প্রত্রিয়ায় সমস্যা
- কাটা এবং ঘা ধীরে ধীরে শুকানো

টাইপ 2 ডায়াবেটিসের প্রায়ই কোন উপসর্গ দেখা যায় না

যদি আপনার বা আপনার পরিবারের কোন সদস্যের উপরের উপসর্গগুলির তিনটি বা তার বেশি থেকে থাকে, তাহলে, অবশ্যই ডায়াবেটিসের পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া কি?

হাইপোগ্লাইসেমিয়া, বা লো ব্লাড সুগার হল, যখন আপনার ব্লাড সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা, খাওয়ার আগে 120 mg/dl, এবং খাওয়ার পরে 180 mg/dl হয়। যদি এরকম প্রায়ই হটে, তাহলে এটা এমন সমস্যা যার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আপনার ডাক্তার কে তা জানান।

উপসর্গগুলি হল:

- মিষ্টি এবং খানে কাঁপুনি
- ক্লান্ত বোধ করা
- ক্লুধা বৃদ্ধি
- দ্রুত হাদস্পন্দন অনুভব করা
- বিহ্বল বোধ করা
- অস্পষ্ট দেখা বা মাথা ঘৃতনা

আপনার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার উপসর্গগুলি অনুভব করার কোন প্রয়োজন নেই।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসা

আপনার লো ব্লাড সুগারের চিকিৎসা **এখনই** করা জরুরী। যদি আপনার ব্লাড সুগারের পরিমাণ 70 mg/dl এর কম হয়, এবং যদি আপনি গর্ভবতী না হন, তাহলে নিচের যে কোন একটি গুরুত্ব করুন:

- ½ কাপ ফলের রস, অথবা সাধারণ সোডা (সুগার ফ্রি নয়)
- 1 এক টেবিল চামচ মধু, বা চিনি

যদি আপনি ১৫ মিনিটের মধ্যে ভাল বোধ না করেন, তাহলে চিনির সঙ্গে আরও কিছু খেয়ে আবার চেষ্টা করুন। এর পরেও যদি আপনার ব্লাড সুগার লো থাকে, তবে ডাক্তারকে এখনই ডাকুন!

হাইপারগ্লাইসেমিয়া কি ?

হাইপারগ্লাইসেমিয়া, অথবা উচ্চ ব্লাড সুগার হল, যখন আপনার ব্লাড সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা, খাওয়ার আগে 120 mg/dl, এবং খাওয়ার পরে 180 mg/dl হয়। যদি এরকম প্রায়ই হটে, তাহলে এটা এমন সমস্যা যার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আপনার ডাক্তার কে তা জানান।

উপসর্গগুলি হল:

- অস্বাভাবিক ভাবে ক্লুধা বা ত্বক বেড়ে যাওয়া
- প্রায়ই ঘন ঘন প্রস্তাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে
- শুকনো অথবা খসখসে চামড়া
- ক্লান্ত অথবা দ্রুত বোধ করা
- অস্পষ্ট দেখা
- ঘন ঘন সংক্রমণ

হাইপারগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসা

আপনার হাইপারগ্লাইসেমিয়া আছে তা জানার কয়েক ঘন্টার মধ্যে এর চিকিৎসা আরম্ভ করা আতঙ্ক জরুরী। এর চিকিৎসার মধ্যে থাকতে পারে ওয়ুধ বা তার ডোজের পরিবর্তন, আরও যত্ন সহকারে খাদ্য পরিকল্পনা, এবং নিয়মিত ব্যায়াম।

ডায়াবেটিসের উপর আরও তথ্য জানার জন্য, থ্বর দিন :

মেট্রো প্লাস কেয়ার ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন লাইন

1-800-579-9798

এই প্রতিকার্য যে সব তথ্যগুলি দেওয়া আছে, তা মেডিকেল কেয়ার বা ডাক্তারের পরামর্শের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ডাক্তার আপনার নিজস্ব উপসর্গগুলি দেখে যা চিকিৎসার পরামর্শ দেবেন, তা এর থেকে আলাদা হতে পারে।

MetroPlus Health Plan
160 Water St. 3rd Fl, New York, NY 10038

সদস্যের তথ্যের জন্য:

1-800-303-9626

মেট্রো প্লাস হেল্প প্ল্যানের জন্য তথ্য :

1-800-475-METRO

www.MetroPlus.org

02/07 (BEN)

ডায়াবেটিস কি ?

(What is Diabetes?)



MetroPlus
I-800-475-METRO
W W W . M E T R O P L U S . O R G