



## المعلومات والتعليمات

عندما تملأ النموذج وتضغط على "Screen/Print Form" "فحص/ طباعة النموذج"، سيحدد جهاز الكمبيوتر أي مضاد حيوي سوف تتلقاه. اطبع النموذج المكتمل وأحضره معك إلى نقطة POD. سيسمح هذا لفريق العمل بخدمتك بشكل أفضل. ستتاح أيضًا نماذج فارغة لدى نقاط POD.

**السؤال 1:** رد الفعل التحسسي الشديد هو رد فعل مهدد للحياة وقد يسبب مشكلات بالتنفس و/أو البلع أو تورم الوجه أو العينين أو اللسان أو ألم في الصدر. تتضمن الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية الإسهال واضطراب المعدة ولا تعد تلك ردود فعل تحسسية شديدة.

التتراسايكليينات هي مجموعة من المضادات الحيوية (تتضمن دوكسيسايكلين ومينوسايكلين وتتراسايكليين) تقي من حالات العدوى البكتيرية أو تعالجها. لا يمكن للأشخاص الذين سبق وأصيبوا برد فعل تحسسي شديد تجاه دوكسيسايكلين أو تتراسايكلينات أخرى أن يتناولوا دوكسيسايكلين؛ وينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 2:** بصفة عامة يُفضل استخدام سيبروفلوكساسين في حالة السيدات الحوامل. ولكن، إذا كان سبق لهن التعرض للجمرة الخبيثة، يمكن أيضًا أن يتناولن دوكسيسايكلين للوقاية من حالات العدوى بالجمرة الخبيثة. قد تتلقى السيدات الحوامل إما دوكسيسايكلين أو سيبروفلوكساسين وفقًا لإجابتهن على أسئلة الفحص الأخرى. وينبغي أن يجبن بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 3:** رد الفعل التحسسي الشديد هو رد فعل مهدد للحياة وقد يسبب مشكلات بالتنفس و/أو البلع أو تورم الوجه أو العينين أو اللسان أو ألم في الصدر. تتضمن الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية الإسهال واضطراب المعدة ولا تعد تلك ردود فعل تحسسية شديدة.

الفلوروكينولونات هي مجموعة من المضادات الحيوية (تتضمن سيبروفلوكساسين وليفوفلوكساسين وموكسيفلوكساسين) تقي من حالات العدوى البكتيرية أو تعالجها. لا يمكن للأشخاص الذين قد سبق وأصيبوا برد فعل تحسسي شديد تجاه سيبروفلوكساسين أو فلوروكينولونات أخرى أن يتناولوا سيبروفلوكساسين؛ وينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 4:** الوهن العضلي الوبيل هو حالة مزمنة تسبب ضعف العضلات. يمكن لسيبروفلوكساسين أن يجعل أعراض الوهن العضلي الوبيل أسوأ. ليس لدوكسيسايكلين هذا الأثر. لا يمكن للأشخاص الذين سبق تشخيص إصابتهم بالوهن العضلي الوبيل أن يتناولوا سيبروفلوكساسين؛ وينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 5:** تيزانيدين (زانافليكس) هو دواء يخفف التشنجات العضلية. يمكن لسيبروفلوكساسين أن يزيد من سوء الآثار الجانبية لتيزانيدين (زانافليكس). ليس لدوكسيسايكلين هذا الأثر. لا يمكن للأشخاص الذين يتناولوا تيزانيدين (زانافليكس) في الوقت الحالي أن يتناولوا سيبروفلوكساسين؛ وينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 6:** ثيوفيلين هو دواء يعالج بعض مشكلات التنفس. يمكن لسيبروفلوكساسين أن يزيد من سوء الآثار الجانبية لثيوفيلين. ليس لدوكسيسايكلين هذا الأثر. لا يزال بإمكان الأشخاص الذين يتناولون ثيوفيلين في الوقت الحالي تناول سيبروفلوكساسين، ولكن يجب أن يتم التحقق من مستويات ثيوفيلين لديهم. ينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 7:** يُقصد بالمرض الكلوي أن الكليتين تالفتان ولا يمكنهما تنقية الدم بالشكل الطبيعي. يقل تلف الكلى من قدرة الجسم على معالجة سيبروفلوكساسين، بينما لا يقل تلف الكلى من قدرة الجسم على معالجة دوكسيسايكلين. لا يزال بإمكان الأشخاص المصابين بمرض كلوي أو الخاضعين للغسيل الكلوي، تناول سيبروفلوكساسين، لكن قد يحتاجوا إلى جرعة أقل. ينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 8:** يمكن للأشخاص غير القادرين على بلع أقراص الدواء أن يتقيؤوا أو يختنقوا بسبب القرص. ويجب أن يتلقوا مضادًا حيويًا سائلًا أو مضادًا حيويًا يمكن سحقه. ينبغي أن يجيب الأشخاص غير القادرين على بلع الأقراص بـ"نعم" على هذا السؤال.

**السؤال 9:** قد يحتاج الأشخاص الذين يقل وزنهم عن 76 رطلاً أو 35 كيلو جرامًا جرعة أقل من المضاد الحيوي. ينبغي أن يجيبوا بـ"نعم" على هذا السؤال ويذكروا أوزانهم.