



## Informazioni e istruzioni

Durante la compilazione del modulo, fare clic su “Visualizza/Stampa modulo” e il sistema assegnerà automaticamente l’antibiotico più indicato. Stampare il modulo compilato e portarlo con sé per il ritiro del farmaco presso un POD, in modo da accelerare i tempi del servizio. È possibile compilare il modulo anche presso un POD.

**Domanda 1:** una reazione allergica grave è potenzialmente letale e può causare problemi di respirazione e/o deglutizione, gonfiore del viso, degli occhi o della lingua o dolore toracico. Gli effetti collaterali più comuni sono diarrea e disturbi di stomaco, che non sono considerati reazioni allergiche gravi.

Le tetracicline sono un gruppo di antibiotici (di cui fanno parte doxiciclina, minociclina e tetraciclina) che prevengono l’insorgere di infezioni batteriche o le curano. Le persone che hanno manifestato una reazione allergica grave alla doxiciclina o ad altre tetracicline non possono assumere la doxiciclina e devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 2:** per le donne in gravidanza viene in genere preferito l’uso della ciprofloxacina. Tuttavia, in caso di esposizione all’antrace, possono assumere la doxiciclina per prevenire infezioni da antrace. Alle donne in gravidanza può essere somministrata la doxiciclina o la ciprofloxacina, a seconda delle loro risposte alle altre domande di screening. Queste persone devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 3:** una reazione allergica grave è potenzialmente letale e può causare problemi di respirazione e/o deglutizione, gonfiore del viso, degli occhi o della lingua o dolore toracico. Gli effetti collaterali più comuni sono diarrea e disturbi di stomaco, che non sono considerati reazioni allergiche gravi.

I fluorochinoloni sono un gruppo di antibiotici (di cui fanno parte ciprofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina) che prevengono l’insorgere di infezioni batteriche o le curano. Le persone che hanno manifestato una reazione allergica grave alla ciprofloxacina o ad altri fluorochinoloni non possono assumere la ciprofloxacina e devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 4:** la miastenia gravis è una malattia cronica che causa l’indebolimento muscolare. La ciprofloxacina può peggiorare i sintomi della miastenia gravis. La doxiciclina non produce questo effetto. Le persone a cui è stata diagnosticata la miastenia gravis non possono assumere la ciprofloxacina e devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 5:** la tizanidina (Zanaflex) è un farmaco che allevia gli spasmi muscolari. La ciprofloxacina può peggiorare gli effetti collaterali della tizanidina (Zanaflex). La doxiciclina non produce questo effetto. Le persone che attualmente assumono la tizanidina (Zanaflex) non possono assumere la ciprofloxacina e devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 6:** la teofillina è un farmaco per il trattamento di alcuni problemi respiratori. La ciprofloxacina può peggiorare gli effetti collaterali della teofillina. La doxiciclina non produce questo effetto. Le persone a cui viene attualmente somministrata la teofillina possono continuare ad assumere la ciprofloxacina, ma devono tenere sotto controllo il livello di teofillina. Queste persone devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 7:** l’insufficienza renale indica una lesione dei reni, i quali non riescono a filtrare regolarmente il sangue. La lesione a carico dei reni riduce la capacità dell’organismo di metabolizzare la ciprofloxacina. Non riduce tuttavia la capacità dell’organismo di metabolizzare la doxiciclina. Le persone affette da insufficienza renale o in dialisi possono continuare ad assumere la ciprofloxacina, sebbene a dosaggi inferiori. Queste persone devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 8:** le persone che non sono in grado di deglutire compresse possono vomitare, avere conati o soffocare se tentano di ingerirle. In questi casi, è necessario somministrare antibiotici in forma liquida o antibiotici che è possibile polverizzare. Le persone che non sono in grado di deglutire compresse devono rispondere “Sì” a questa domanda.

**Domanda 9:** le persone che pesano meno di 76 libbre o 35 kg possono necessitare di un dosaggio inferiore di antibiotico. Queste persone devono rispondere “Sì” a questa domanda e indicare il proprio peso.