

Información e instrucciones

Cuando complete el formulario y haga clic en "Pantalla/Imprimir formulario", la computadora determinará qué antibiótico tomará. Imprima el formulario completo y llévelo con usted a un POD. Esto permitirá que el personal lo atienda más rápido. Además, habrá a su disposición formularios en blanco en los POD.

Pregunta 1: Una reacción alérgica grave es una respuesta potencialmente mortal que puede causar problemas para respirar o tragar; hinchazón del rostro, los ojos o la lengua; o dolor de pecho. Los efectos secundarios comunes de los antibióticos incluyen diarrea y malestar estomacal, y no se consideran reacciones alérgicas graves.

Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos (incluidas la doxiciclina, la minociclina y la tetraciclina) que evita o trata las infecciones bacterianas. Las personas que han tenido una reacción alérgica grave a la doxiciclina o a otras tetraciclinas no pueden tomar doxiciclina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 2: Generalmente, se recomienda ciprofloxacina para las mujeres embarazadas. Sin embargo, si han estado expuestas a ántrax, también pueden tomar doxiciclina para evitar la infección por ántrax. Las mujeres embarazadas pueden recibir tanto doxiciclina como ciprofloxacina, según sus respuestas a las demás preguntas de identificación. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 3: Una reacción alérgica grave es una respuesta potencialmente mortal que puede causar problemas para respirar o tragar; hinchazón del rostro, los ojos o la lengua; o dolor de pecho. Los efectos secundarios comunes de los antibióticos incluyen diarrea y malestar estomacal, y no se consideran reacciones alérgicas graves.

Las fluoroquinolonas son un grupo de antibióticos (incluidas la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina) que evita o trata las infecciones bacterianas. Las personas que han tenido una reacción alérgica grave a la ciprofloxacina o a otras fluoroquinolonas no pueden tomar ciprofloxacina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 4: La miastenia gravis es una afección crónica que causa debilidad muscular. La ciprofloxacina puede empeorar los síntomas de la miastenia gravis. La doxiciclina no tiene este efecto. Las personas que han sido diagnosticadas con miastenia gravis no pueden tomar ciprofloxacina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 5: La tizanidina (Zanaflex) es un medicamento que alivia los espasmos musculares. La ciprofloxacina puede empeorar los efectos secundarios de la tizanidina (Zanaflex). La doxiciclina no tiene este efecto. Las personas que actualmente están tomando tizanidina (Zanaflex) no pueden tomar ciprofloxacina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 6: La teofilina es un medicamento que trata algunos problemas respiratorios. La ciprofloxacina puede empeorar los efectos secundarios de la teofilina. La doxiciclina no tiene este efecto. Las personas que actualmente están tomando teofilina pueden tomar ciprofloxacina, pero deben controlar sus niveles de teofilina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 7: La enfermedad renal implica que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre normalmente. El daño renal reduce la capacidad del organismo de procesar la ciprofloxacina. El daño renal no reduce la capacidad del organismo de procesar la doxiciclina. Las personas que tienen enfermedad renal o que se someten a diálisis pueden tomar ciprofloxacina, pero es posible que necesiten una dosis más baja. Deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 8: Las personas que no pueden tragar pastillas pueden vomitar o atragantarse con una pastilla, o esta les puede producir náuseas. Deben recibir un antibiótico líquido o un antibiótico que pueda machacarse. Las personas que no pueden tragar pastillas deben responder "Sí" a esta pregunta.

Pregunta 9: Es posible que las personas que pesen menos de 76 lb o 35 kg necesiten una dosis más baja del antibiótico. Deben responder "Sí" a esta pregunta e indicar su peso.