

אינפארמאציע און אנווייזונגען

ווען איר פולט אויס דעם פארעם און קליקט אויף "סקרין/פרינט פארעם", וועט דער קאמפיוטער באשטימען וועלכער אנטויביאטיק איר באקומט. דרוקט דעם אויסגעפולטן פארעם און ברענגט עס מיט זיך צו א POD. דאס וועט ערלויבן די שטאב אייך צו סערווירן שנעלער. ליידיגע פארעםס וועלן אויך זיין אוועילעבל ביי POD'ס.

פראגע 1: אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע איז א לעבנס-דראענדע רעאקציע וואס קען פאראורזאכן פראבלעמען מיטן אטעמען און/אדער שלינגען, געשווילעכץ אויפן פנים, אויגן אדער צונג, אדער ברוסטקאסטן ווייטאג. אפטע זייטיגע ווירקונגען פון אנטויביאטיקס רעכענען אריין דייעריע און אומרואיגע מאגן און ווערן נישט פאררעכנט אלס ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

Tetracyclines זענען א גרופע אנטויביאטיקס (אריינגערעכנט doxycycline, minocycline און tetracycline) וועלכע פארמיידן אדער באהאנדלען באקטעריע אינפעקציעס. א מענטש וועלכע האט געהאט אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע צו doxycycline אדער אנדערע tetracyclines קען נישט נעמען doxycycline; אזעלכע זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 2: Ciprofloxacin איז געווענליך פארצוגליך פאר א מענטש וואס איז טראגעדיג. פונדעסטוועגן, אויב אזא איינער איז געווארן אויסגעשטעלט צו ענטרעקס, קען מען אויך נעמען doxycycline צו פארמיידן ענטרעקס אינפעקציע. א מענטש וואס איז טראגעדיג קען באקומען אדער doxycycline אדער ciprofloxacin געוואנדן אויף זייערע ענטפערס צו די אנדערע סקריינינג פראגעס. זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 3: אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע איז א לעבנס-דראענדע רעאקציע וואס קען פאראורזאכן פראבלעמען מיטן אטעמען און/אדער שלינגען, געשווילעכץ פונעם פנים, אויגן אדער צונג, אדער ברוסטקאסטן ווייטאג. אפטע זייטיגע ווירקונגען פון אנטויביאטיקס רעכענען אריין דייעריע און אומרואיגע מאגן און ווערן נישט פאררעכנט אלס ערנסטע אלערגישע רעאקציע.

Fluoroquinolones זענען א גרופע אנטויביאטיקס (אריינגערעכנט ciprofloxacin, levofloxacin און moxifloxacin) וועלכע פארמיידן אדער באהאנדלען באקטעריע אינפעקציעס. א מענטש וועלכע האט געהאט אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע צו ciprofloxacin אדער אנדערע fluoroquinolones קען נישט נעמען ciprofloxacin; זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 4: Myasthenia gravis איז א כראנישע צושטאנד וואס איז גורם מוסקל שוואכקייט. Ciprofloxacin קען פארערגערן די סימפטאמען פון myasthenia gravis. Doxycycline האט נישט דעם ווירקונג. א מענטש וואס האט שוין אמאל געהאט א דיאגנאז פון myasthenia gravis קען נישט נעמען ciprofloxacin; זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 5: Tizanidine (Zanaflex) איז א מעדיצין וואס פארלייכטערט מוסקל ספאזמס. Ciprofloxacin קען מאכן די זייטיגע ווירקונגען פון Tizanidine (Zanaflex) ערגער. Doxycycline האט נישט דעם ווירקונג. א מענטש וואס נעמט יעצט Tizanidine (Zanaflex) קען נישט נעמען ciprofloxacin; זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 6: Theophylline איז א מעדיצין וואס באהאנדלט געוויסע אטעמען פראבלעמען. Ciprofloxacin קען מאכן די זייטיגע ווירקונגען פון Theophylline ערגער. Doxycycline האט נישט דעם ווירקונג. א מענטש וואס נעמט יעצט Theophylline קען נאך אלס נעמען Ciprofloxacin אבער מען דארף אונטערזוכן זייערע Theophylline שטאפלען. זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 7: נירן קראנקהייט מיינט אז די נירן זענען געשעדיגט און קענען נישט דורכזייען די בלוט ווי נארמאל. נירן שאדן פארמינערט דעם קערפער'ס פעאיגקייט צו פראצעסירן Ciprofloxacin. נירן שאדן פארמינערט נישט דעם קערפער'ס פעאיגקייט צו פראצעסירן doxycycline. א מענטש וואס האט נירן קראנקהייט, אדער איז אויף דיאליסעס, קען נאך אלס נעמען Ciprofloxacin אבער קען דארפן א נידריגערע דאזע. זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 8: א מענטש וואס איז נישט פעאיג צו שלינגען פילן קען ברעכן, קרעקן אדער זיך שטיקן אויף א פיל. זיי מוזן באקומען א פליסיגע אנטויביאטיק אדער אן אנטויביאטיק וואס קען ווערן צעמאלן. א מענטש וואס איז נישט פעאיג צו שלינגען פילן זאל ענטפערן "יא" אויף די פראגע.

פראגע 9: א מענטש וואס וועגט ווייניגער ווי 76 פונט אדער 35 קג קען דארפן א נידריגערע דאזע פון אנטויביאטיק. זיי זאלן ענטפערן "יא" אויף די פראגע און אריינשרייבן זייער וואג.