

## Pré-initiation

### Médicaments contre le VIH par voie orale



#### Préparation orale\*

Prenez un comprimé de CAB 30 mg (nom de marque : Vocabria) et un comprimé de RPV 25 mg (nom de marque : Edurant) ensemble par voie orale une fois par jour avec un repas complet pendant 30 jours maximum

ou

**Continuez à prendre les médicaments contre le VIH par voie orale tels qu'ils sont prescrits**

## Initiation

### Premier mois



## Continuation

### Deuxième mois et au-delà




- Vous commencerez les injections le dernier jour de la préparation orale\* ou le dernier jour de prise de vos médicaments contre le VIH par voie orale actuels.
- Pour le premier rendez-vous d'injections, vous recevrez deux injections (3 millilitres [ml] chacune) dans le muscle fessier.
- Chaque mois après ces injections initiales, vous recevrez deux injections (2 ml chacune) dans le muscle fessier.
- Il est important de recevoir vos injections dans la « fenêtre temporelle de sept jours » appropriée.
  - ◆ La fenêtre temporelle de sept jours comprend les sept jours avant et les sept jours après votre date convenue d'injections.
- Discutez d'un plan de secours avec votre prestataire de soins VIH si vous ne pouvez pas recevoir d'injections dans la fenêtre temporelle de sept jours.
- Communiquez à votre prestataire tout effet secondaire, toute inquiétude ou tout changement dans vos médicaments.

Les médicaments sont commercialement disponibles en tant que : CAB oral (Vocabria), RPV orale (Edurant) et CAB/RPV à longue durée d'action (Cabenuva).

\* = Option pour voir comment votre corps réagit aux médicaments ; CAB = cabotégravir ; RPV = rilpivirine

# À quoi s'attendre avec une dose de CAB/RPV tous les deux mois



Les médicaments sont commercialement disponibles en tant que : CAB oral (Vocabria), RPV orale (Edurant) et CAB/RPV à longue durée d'action (Cabenuva).

\* = Option pour voir comment votre corps réagit aux médicaments ; CAB = cabotégravir ; RPV = rilpivirine