

Czego należy się spodziewać w przypadku przyjmowania kabotegrawiru/rylpiwiryny (cabotegravir/rilpivirine, CAB/RPV) raz w miesiącu

Przed rozpoczęciem	Rozpoczęcie	Kontynuacja
Doustne leki na HIV	Pierwszy miesiąc	Drugi miesiąc i później
 Faza wprowadzająca z lekami doustnymi* Doustne zażycie jednej tabletki CAB 30 mg (nazwa handlowa: Vocabria) wraz z jedną tabletką RPV 25 mg (nazwa handlowa: Edurant) raz dziennie podczas posiłku przez okres do 30 dni <i>lub</i> Dalsze przyjmowanie doustnych leków na HIV zgodnie z zaleceniami lekarza	 • Zastrzyki rozpoczną się w ostatnim dniu fazy wprowadzającej z lekami doustnymi* <i>lub</i> w ostatnim dniu przyjmowania dotychczas stosowanych doustnych leków na HIV. • Podczas pierwszej wizyty odbywanej w celu wykonania zastrzyków otrzymasz dwa zastrzyki (po 3 mililitry [ml] każdy) w miesiąc pośladkowy. • Później co miesiąc otrzymasz dwa zastrzyki (po 2 ml każdy) w miesiąc pośladkowy. • To bardzo ważne, aby zastrzyki były przyjmowane w odpowiednim siedmiodniowym oknie czasowym. ♦ Siedmiodniowe okno czasowe obejmuje siedem dni przed uzgodnionym terminem wykonania zastrzyków lub siedem dni po nim. • Jeśli nie możesz przyjąć zastrzyków w ramach siedmiodniowego okna czasowego, omów plan zapasowy z lekarzem prowadzącym Twoje leczenie HIV. • Koniecznie informuj lekarza o wszelkich działaniach niepożądanych, swoich obawach oraz zmianach w przyjmowanych lekach.	

Leki są dostępne w sprzedaży jako: CAB w postaci doustnej (Vocabria), RPV w postaci doustnej (Edurant) i długodziałające CAB/RPV (Cabenuva).

* = opcja mająca na celu sprawdzenia reakcji organizmu na leki; CAB = kabotegrawir; RPV = rylpiwiryna

Czego należy się spodziewać w przypadku przyjmowania CAB/RPV co dwa miesiące



Leki są dostępne w sprzedaży jako: CAB w postaci doustnej (Vocabria), RPV w postaci doustnej (Edurant) i długodziałające CAB/RPV (Cabenuva).
 * = opcja mająca na celu sprawdzenia reakcji organizmu na leki; CAB = kabotegrawir; RPV = ryłpiwiryna