

کیبوٹیگراویر (Cabotegravir, CAB) / رلیپویرین (Rilpivirine, RPV) کی مابانہ ایک بار خوراک سے کیا توقع کی جائے

تسلسل

دو ماہ اور آگے



آغاز

پہلا مہینہ



آغاز سے پہلے

HIV کی بذریعہ منہ لی جانے والی ادویات



- آپ بذریعہ منہ ابتدائی مرحلے * کی ادویات یا موحودہ بذریعہ منہ لی جانے والی HIV ادویات کے آخری دن پر انہیکشنز شروع کریں گے۔
- انہیکشن کی پہلی اپائنٹمنٹ پر، آپ کو دو انہیکشنز (ہر ایک 3 ملی لیٹر [ایم ایل]) کولہوؤں کے پٹھوں میں لگائے جائیں گے۔
- اس کے بعد ہر مہینے، آپ کو دو انہیکشنز (ہر ایک 2 ملی لیٹر) کولہوؤں کے پٹھوں میں لگائے جائیں گے۔
- یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے انہیکشنز مناسب "سات دن کی مدت" کے اندر لگوائیں۔
- سات دن کی مدت میں، آپ کے انہیکشن کی متفقہ تاریخ سے پہلے اور بعد کے سات دن شامل ہیں۔
- اگر آپ سات دن کی مدت کے اندر انہیکشنز نہیں لگوا پاتے، تو اپنے HIV نگہداشت فراہم کنندہ سے بیک اپ پلان کے بارے میں بات کریں۔
- کسی بھی قسم کے ضمنی اثرات، خدشات یا اپنی ادویات میں تبدیلیوں کے بارے میں اپنے فراہم کنندہ کو مطلع کریں۔

بذریعہ منہ ابتدائی مرحلہ *

CAB کی 30 ملی گرام کی ایک گولی (برانڈ کا نام: Vocabria) اور RPV 25 ملی گرام کی ایک گولی (برانڈ کا نام: Edurant) کو ملا کر ایک مکمل کھانے کے ساتھ روزانہ ایک بار بذریعہ منہ 30 دن تک لیا جائے

یا

بیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس
(Human Immunodeficiency Virus, HIV)
کی بذریعہ منہ لی جانے والی حالیہ ادویات جیسے
تجویز شدہ ہیں لینا جاری رکھیں

ادویات تجارتی طور پر ان ناموں سے دستیاب ہیں: اورل (Cabotegravir, CAB)، اورل (Rilpivirine, RPV) اور طویل اثرات کی حامل (CAB/RPV Cabenuva)۔
* = آپ کے جسم کے ادویات پر ردعمل کو دیکھنے کا آپشن؛ CAB = کیبوٹیگراویر؛ RPV = رلیپویرین

CAB/RPV کی ہر دو ماہ بعد کی خوراکوں سے کیا توقع کی جائے

تسلسل

آغاز

آغاز سے پہلے

چوتھا، چھٹا، آٹھواں
مہینہ اور آگے

تیسرا مہینہ

دوسرا مہینہ

پہلا مہینہ

HIV کی بذریعہ منہ
لی جانے والی ادویات



بذریعہ منہ ابتدائی مرحلہ*

CAB کی 30 ملی گرام کی ایک گولی (برانڈ کا نام: Vocabria) اور RPV کی 25 ملی گرام کی ایک گولی (برانڈ کا نام: Edurant) کو ملا کر ایک مکمل کھانے کے ساتھ روزانہ ایک بار بذریعہ منہ 30 دن تک لیا جائے:

یا

ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس (HIV, HIV Virus) کی بذریعہ منہ لی جانے والی حالیہ ادویات جیسے تجویز شدہ ہیں لینا جاری رکھیں

- آپ اپنی بذریعہ منہ ابتدائی مرحلہ* کی ادویات یا موجودہ بذریعہ منہ لی جانے والی HIV ادویات کے آخری دن پر انچیکشنز شروع کریں گے۔
- یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ادویات آپ کے جسم میں صحیح سطح پر موجود ہوں، آپ کو درج ذیل انچیکشنز لگیں گے:
 - ♦ پہلے اور دوسرے مہینے میں ایک ماہانہ، پھر
 - ♦ ہر دو ماہ بعد ایک۔
- انچیکشن کی ہر اپائنٹمنٹ پر، آپ کو دو انچیکشنز (ہر ایک 3 ملی لیٹر) کولہوؤں کے پٹھوں میں لگائے جائیں گے۔
- یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے انچیکشنز مناسب "سات دن کی مدت" کے اندر لگوائیں۔
 - ♦ سات دن کی مدت میں، آپ کے انچیکشن کی متفقہ تاریخ سے پہلے یا بعد کے سات دن شامل ہیں۔
- اگر آپ سات دن کی مدت کے اندر انچیکشنز نہیں لگوا پاتے، تو اپنے HIV نگہداشت فراہم کنندہ سے بیک اپ پلان کے بارے میں بات کریں۔
- کسی بھی قسم کے ضمنی اثرات، خدشات یا اپنی ادویات میں تبدیلیوں کے بارے میں اپنے فراہم کنندہ کو مطلع کریں۔

ادویات تجارتی طور پر ان ناموں سے دستیاب ہیں: اورل (Cabotegravir, CAB)، اورل (Rilpivirine, RPV) اور طویل اثرات کی حامل (CAB/RPV Cabenuva)

* = آپ کے جسم کے ادویات پر ردعمل کو دیکھنے کا آپشن؛ CAB = کیبوٹیگراویر؛ RPV = رلپویرین