

A photograph of two men embracing at night. The man on the left is wearing a light-colored jacket and has his arm around the man on the right. The man on the right is wearing a red shirt and a dark jacket. They are both smiling and looking at each other. The background is dark with some blurred lights.

**PrEP**

# PrEP, una pastilla *diaria* para prevenir el VIH

Si usted es VIH negativo y le preocupa ser expuesto al VIH, hable con su médico acerca de si PrEP (profilaxis previa a la exposición) le puede ayudar.

PrEP es una pastilla diaria que le puede proteger contra el VIH siempre y cuando la tome todos los días.

Los condones proporcionan una protección adicional contra el VIH, contra la mayoría de infecciones de transmisión sexual y contra el embarazo no deseado.

Muchos planes de seguro de salud, incluyendo Medicaid, cubren PrEP. Puede haber asistencia disponible si usted no tiene cobertura de seguro.

Para mayor información, llame al 311 o visite [nyc.gov](http://nyc.gov) y busque “HIV PrEP and PEP”

**NYC**  
Health



PEP

## PEP de *emergencia* para prevenir el VIH

Si usted es VIH negativo y cree que ha sido expuesto al VIH, **vaya inmediatamente** a una clínica o sala de emergencias y solicite **PEP** (profilaxis postexposición).

PEP es un medicamento de emergencia que se toma inmediatamente después de haber sido expuesto al VIH.

PEP puede detener el VIH si lo comienza dentro de las 36 horas después de que haya sido expuesto al VIH. Usted debe continuar tomando PEP por 28 días.

Muchos planes de seguro de salud, incluyendo Medicaid, cubren PEP. Puede haber asistencia disponible si usted no tiene cobertura de seguro.

Para mayor información, llame al 311 o visite [nyc.gov](http://nyc.gov) y busque "HIV PrEP and PEP"

**NYC**  
Health