



Un aperçu du


VIH chez les femmes dans la ville de New York en 2023

Nouveaux cas de VIH diagnostiqués




Un nouveau cas de séropositivité sur cinq était une femme.

Plus de 50 % des nouveaux cas de séropositivité chez les femmes avaient entre 20 et 39 ans.



9 femmes sur 10 étaient noires ou latinas.



Il est estimé que près de 97 % des nouveaux cas de séropositivité chez les femmes ont contracté le VIH par le biais de rapports sexuels.

Sur 10 femmes séropositives :

9,6 ont reçu un diagnostic.

8,9 ont reçu des soins relatifs au VIH.

8,0 se sont vues prescrire des médicaments pour traiter le VIH (traitement antirétroviral).

8,0 avaient une charge virale supprimée.




La PrEP et la prévention du VIH

La PrEP

La prophylaxie pré-exposition (pre-exposure prophylaxis, PrEP) est un traitement efficace et sûr qui empêche l'infection par le VIH. Lorsqu'elle est prise telle que prescrite, la PrEP réduit le risque de contracter le VIH par le biais de rapports sexuels d'environ 99 %.

Seulement 35 % des femmes sexuellement actives¹ ont entendu parler de la PrEP. La connaissance de la PrEP varie selon la race et l'ethnicité chez les femmes :



La PrEP peut être prise sous forme de comprimé une fois par jour ou sous forme de piqûre au cabinet de votre prestataire de soins de santé. Discutez avec votre prestataire pour en savoir plus sur la meilleure option pour votre cas. L'Association américaine des obstétriciens et gynécologues (American College of Obstetricians and Gynecologists) recommande que les obstétriciens et les gynécologues parlent de la PrEP à toutes les patientes sexuellement actives.

Outils de prévention supplémentaires

- Utilisez des préservatifs et autres méthodes barrières.
- Maintenez une charge virale indétectable grâce à la prise de médicaments anti-VIH tels que prescrits. Les personnes vivant avec le VIH qui maintiennent une charge virale indétectable pendant au moins six mois ne peuvent pas transmettre le VIH par le biais de rapports sexuels, un fait également connu sous la forme du slogan « indétectable = intransmissible » (undetectable equals untransmittable, U=U).
- Faites-vous dépister pour le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles.
- Suivez un traitement de prophylaxie post-exposition (post-exposure prophylaxis, PEP) si vous avez été exposée au VIH. La PEP est un traitement d'urgence qui peut prévenir l'infection causée par le VIH.

¹ Sexuellement actif est défini comme ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois.



Les facteurs sociaux ayant un impact sur le VIH

La capacité d'une personne à rester en bonne santé est façonnée par des expériences ou facteurs sociaux qu'elle ne contrôle pas et qui peuvent avoir un impact sur son accès au dépistage, à la prévention et aux services de soins liés au VIH.²

Ces facteurs comprennent un accès limité ou non-existant aux éléments suivants :



Logement



Soins médicaux



Alimentation



Garde d'enfants



Assurance maladie

D'autres expériences qui peuvent avoir un impact sur la santé comprennent les éléments suivants :



Incarcération



Violence domestique



Racisme, sexisme, stigmatisation et discrimination



Ressources supplémentaires

Prévention, dépistage et traitement du VIH

Pour plus d'informations sur la prévention, le dépistage et le traitement du VIH, la PrEP, la PEP et les préservatifs, consultez nyc.gov/health/hiv ou scannez le code QR.

Pour obtenir de l'aide dans votre recherche d'un prestataire, appelez le 311 ou le 844-NYC-4NYC (844-692-4692) ou consultez nyc.gov/health/map.



Conseils et soutien au 988

Contactez le 988 pour bénéficier de services gratuits et confidentiels de conseils en cas de crise, de soutien relatif à la toxicomanie et à la santé mentale, et d'orientation vers des soins.

Appelez ou envoyez un SMS au 988, ou chattez sur nyc.com/988. Les services de SMS et de chat sont disponibles en anglais et en espagnol, et des conseillers sont disponibles par téléphone 24/7 dans plus de 200 langues.

Soutien en cas de violences domestiques et sexistes

Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, êtes victime de violences domestiques ou sexistes, appelez :

- Le **911** en cas d'urgence.
- Le **311** et demandez à être mise en relation avec le centre de justice familiale de la ville de New York (NYC Family Justice Center). Une assistance confidentielle est disponible par téléphone et en personne du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
- La permanence téléphonique contre la violence domestique (Domestic Violence Hotline) 24/7 de la ville de New York pour un plan de mise en sécurité immédiate, une aide à l'hébergement et d'autres ressources. Pour téléscripneur (TTY) : 800-810-7444.

Les informations fournies dans ce document ont été développées en collaboration avec le sous-comité des femmes noires et latinas (Black and Latina Women's Subcommittee) du conseil consultatif des femmes (Women's Advisory Board) du Département de la santé de la ville de New York (NYC Health Department). Toutes les données de surveillance du VIH sont en date du 31 mars 2024 et comprennent des informations relatives aux femmes transgenres et cisgenres.

² Cette liste de facteurs est fournie à titre indicatif et n'est pas exhaustive.