

Fentanyl causes overdose deaths.

**Anyone using heroin, cocaine,
crack or pills from nonmedical sources,
even occasionally, is at risk.**

Reduce your overdose risk:

- Test your drugs using fentanyl test strips.
 - If positive, consider not using. If you do plan to use, start with a small amount and go slowly.
- Avoid using alone. Take turns or call the Never Use Alone hotline at 800-484-3731.
- Avoid mixing drugs.
- Keep naloxone ready and on hand.

For mental health support or resources, call **888-NYC-WELL** (888-692-9355).
For more information, visit **nyc.gov/overdose**.

過量服用吩坦尼會導致死亡。

**任何人使用海洛因、古柯鹼、強效
古柯鹼或從非醫療資源獲得的藥片均面臨風險，
即便是偶爾使用亦不例外。**

降低您的藥物過量風險：

- 使用吩坦尼試紙檢測藥物。
 - 如果檢測結果呈陽性，最好不要使用。如果您真的打算使用，請從少量開始，要慢慢進行。
- 避免獨自使用。輪流使用或致電 Never Use Alone 熱線電話 800-484-3731。
- 避免混合使用藥物。
- 身邊隨時準備好納洛酮。

如需心理健康支援或相關資源，請致電 **888-692-9355**。
如需瞭解詳細資訊，請造訪 **nyc.gov/overdose**。