

Fentanyl causes overdose deaths.

**Anyone using heroin, cocaine,
crack or pills from nonmedical sources,
even occasionally, is at risk.**

Reduce your overdose risk:

- Test your drugs using fentanyl test strips.
 - If positive, consider not using. If you do plan to use, start with a small amount and go slowly.
- Avoid using alone. Take turns or call the Never Use Alone hotline at 800-484-3731.
- Avoid mixing drugs.
- Keep naloxone ready and on hand.

For mental health support or resources, call **888-NYC-WELL** (888-692-9355).
For more information, visit **nyc.gov/overdose**.

Il fentanil causa la morte per overdose.

**Chiunque faccia uso di eroina, cocaina,
crack o pillole di provenienza non medica,
anche occasionalmente, è a rischio.**

Riduci il rischio di overdose:

- Testa lo stupefacente con le strisce reattive al fentanil.
 - Se il risultato del test è positivo, prendi in considerazione la possibilità di non assumerlo. Se hai intenzione di farlo, inizia con una piccola quantità e procedi con cautela.
- Non farne uso se sei da solo. Se ti trovi con altre persone assumetelo a turno, o rivolgiti alla linea diretta Never Use Alone (Mai farne uso da solo) al numero 800-484-3731.
- Evita di mescolare le sostanze stupefacenti.
- Procurati il naloxone e tienilo a portata di mano.

Per ricevere risorse o supporto psicologico, chiama il numero **888-692-9355**.
Per ulteriori informazioni, visita il sito **nyc.gov/overdose**.