Fentanyl causes overdose deaths.

Anyone using heroin, cocaine, crack or pills from nonmedical sources, even occasionally, is at risk.

Reduce your overdose risk:

- Test your drugs using fentanyl test strips.
 - If positive, consider not using. If you do plan to use, start with a small amount and go slowly.
- Avoid using alone. Take turns or call the Never Use Alone hotline at 800-484-3731.
- Avoid mixing drugs.
- Keep naloxone ready and on hand.

For mental health support or resources, call **888-NYC-WELL** (888-692-9355). For more information, visit **nyc.gov/overdose**.



过量服用芬太尼会导致死亡。

任何人使用海洛因、可卡因、强效可卡因或从非医疗资源获得的药片均面临风险,即便是偶尔使用亦不例外。

降低您的药物过量风险:

- 使用芬太尼试纸检测药物。
 - 如果检测结果呈阳性,最好不要使用。如果您真的打算 使用,请从少量开始,然后慢慢增加剂量。
- 避免独自使用。轮流使用或拨打 Never Use Alone 热线 电话 800-484-3731。
- 避免混合使用药物。
- •身边随时准备好纳洛酮。

如需心理健康支持或相关资源,请拨打 888-692-9355。 如需了解详细信息,请访问 nyc.gov/overdose。

