

וויאזוי צו  
טעסטן אייערע  
דראגס

נוצנדיג fentanyl  
טעסט סטריפס

# פארוואס זאל איך טעסטן מיינע דראגס פאר fentanyl?

- fentanyl איז א מאכטפולע אפיאוויד וואס פארגרעסערט די ריזיקע פון איבערדאזע.
- fentanyl ווערט אפט געטראפן אין העראין. עס איז שוין אויך געפונען געווארן אין שטויב cocaine, methamphetamine, און קרעק, ketamine, און אין פילן וואס זענען נישט פון מעדיצינישע קוועלער.
- fentanyl קען נישט ווערן באמערקט דורך זען, טעם, שמעק אדער בארירונג.
- דאס וויסן אויב די מעדעצינען וואס איר פלאנט צו נעמען ענטהאלטן fentanyl קען פארמינערן אייער ריזיקע פון איבערדאזע.



## וואס זענען fentanyl טעסט סטריפס?

- טעסט סטריפס קענען אייך לאזן וויסן אויב אייערע דראגס פארמאגן fentanyl, אבער נישט וויפיל דערפון עס איז דא אדער ווי שטארק עס איז.
- טעסט סטריפס קען צוריקהאלטן איבערדאזע אויב עס ווערט גענוצט פאסיג און מיט אנדערע ריזיקע פארמינערונג פראקטיצירונגען.



# וויאזוי קען איך טעסטן מיינע דראגס פאר fentanyl?

עס זענען פארהאן דריי אופנים צו טעסטן אייערע דראגס פאר fentanyl. וועלט אויס וואס עס ארבעט די בעסטע פאר אייך.

**שריט 1: וועלט אויס אייער אויסוואל.**

## ערשטע ברירה

- צולאזט אלע דראגס וואס איר פלאנט צו נוצן אין וואסער נאכפאלגנדיג די אנווייזונגען אין **שריט 2**.



- דאס איז די מערסט אקוראטע וועג צו טעסטן אייערע דראגס וויבאלד fentanyl ווערט נישט אלעמאל אייניג אויסגעמישט אדורך און אדורך. אויב איר קענט נישט טעסטן אייער דראגס אויף דעם וועג, פרובירט **אויסוואל 2** אדער **3**.
- נאכן טעסטן אייערע דראגס אויף דעם וועג, קענט איר עס טרינקען, עס אריינאטעמען דורך די נאז נוצנדיג א ריינע נאז שפריץ מאשין, אדער ווארטן ביז די וואסער וועפט אויס עס צו נוצן.

## צווייטע ברירה

- צומאל גענצליך אייערע דראגס אויף א ריינעם אויבערפלאך.
- לייגט אריין די צומאלענע מעדעצין אין א קליינע פלאסטיק זעקל און שאקלט דעם זעקל ביז עס דעקט צו די אינעווייניג פונעם זעקל.
- ליידיגט אויס דאס זעקל און לייגט די דראגס אין דער זייט. אביסל אפפאל פון דער דראג זאל בלייבן אינעם זעקל.
- לייגט צו וואסער צום זעקל נאכפאלגדיג די אנווייזונגען אין **שריט 2**.



## דריטע ברירה



- לייג 10 מיליגראם (מ"ג) פון אייערע דראגס (גענוג צוצודעקן עיברעהעמס לינקאלן'ס האר אויף א פעני) אין א ריינע, טרוקענע האלטער.
- אויב איר קענט נישט טעסטן 10 מ"ג פון אייער מעדעצין, לייג כאטש עטליכע קערלעך אין א ריינעם טרוקענעם האלטער.
- לייגט צו וואסער צום האלטער נאכפאלגדיג די אנווייזונגען אין שריט 2.

### שריט 2: לייגט צו וואסער.

- לייגט צו וואסער צו אייער מעדעצין און מישט עס אויס.



- פאר יעדע 10 מ"ג פון דראג, לייגט צו 1 טיי-לעפל, וואס איז אייניג צו 5 מיליליטער (מייג), פון וואסער.
- אויב איר טעסט דאס וואס בלייבט איבער אין א פלעסטיק זעקל ווי געשילדערט אין אויסוואל 2, נוצט 1 טיי-לעפל אדער 5 מ"ל פון וואסער, אזויווי עס וואלט געווען 10 מ"ג פון מעדעצין.


### שריט 3: נוצט דעם טעסט סטריפ.

- פלאצירט דעם סטריפ מיט דאס זייט וואס האט כוואליע פארעמס אין דעם וואסער. טינקט נישט איין די סטריפ אין ד וואסער ווייטער ווי די כוואליע פארעמס.

- לאזט דעם סטריפ איינזאפן די וואסער פאר 15 סעקונדעס.

- נעמט ארויס דעם סטריפ און לייגט עס אויף א פלאכן אויבערפלאך פאר צוויי מינוט.

- ליינט דעם רעזולטאט.



## עצות צו טעסטן אייערע דראגס:

- נוצט נישט טעסט סטריפס מער ווי איינמאל.
- צומאלט גענצליך פילן און טאבלעטן, לייגט צו וואסער און מישט עס גוט אויס. אויב איר ווילט נישט טעסטן די גאנצע פיל, צוברעכט עס אין האלב און טעסט א חלק פון דעם מיטן.

## וואס מיינען די טעסט רעזולטאטן?



- **פאזיטיווע טעסט:** fentanyl אדער אן אנדערע ענליכע סינטעטישע אפיאוויד איז געווארן אויפגעכאפט אין אייער דראג. אויב איר פלאנט נישט צו נוצן fentanyl אדער אפיאוויד, פארמיידט אייך פון נוצן די דראגס, אדער קוקט איבער די "וואס נאך קען איך טון צו פארקלענערן די ריזיקע פון איבערדאזע?" אפטיילונג אויף די אונטערשטן טייל פון די מאטריאל.



- **נעגאטיווע טעסט:** fentanyl אדער אן ענליכע סינטעטישע אפיאוויד איז נישט געווארן אויפגעכאפט אין אייערע דראגס. געדענקט, קיין שום טעסט איז נישט 100% אקוראט און אייער דראגס קען נאך אלץ ענטהאלטן fentanyl אדער אן ענליכע סינטעטישע אפיאוויד.



- **נישט ריכטיגע טעסט:** איין ליניע אויף די רעכטע זייט אדער קיין איין ליניע צייגט אז עס איז נישט א ריכטיגע טעסט. אויב מעגליך, טעסט איבער אייערע דראגס נוצנדיג א נייע סטריפ.

# וואס נאך קען איך טון צו פארקלענערן מיין ריזיקע פאר אן איבערדאזע?

- נוצט דראגס מיט אנדערע מענטשן און און בייט זיך מיט זיי דאס צו נוצן.



- האנדלט אייך איין naloxone, וואס איז א זיכערע און גרינג-צו-נעמען דראג וואס קען צוריקדרייען די אפעקט פון אן אפיאוויד איבערדאזע.



- פארן נוצן דראגס, בעט איינעם וועמען איר געטרויעט, אייך אפט נאכצוקוקן.

- גייט צוביסלעך דורך נעמען קליינע קוואנטומען.



- פארמיידט צו מישן דראגס.

פאר מער אינפארמאציע, סקענט די QR קאוד אדער באזוכט [.nyc.gov/fentanyl](https://www.nyc.gov/fentanyl)

