


# كيفية اختبار مخدراتك

## باستخدام شرائط اختبار فينتانيل


1. ضع المخدرات التي تريد اختبارها في وعاء صغير غير مستخدم.

كلما زادت كمية المخدرات التي تختبرها، كانت النتائج أكثر مصداقية.




2. أضف الماء إلى المخدرات واخلطهما.

أضف ملعقة صغيرة واحدة، أي ما يعادل 5 मिलيلترات، من الماء لكل 10 مغم من المخدرات.




تكفي 10 مغم لتغطية شعر أبراهام لنكولن في الصورة الموجودة على البنس، أو ملء ملعقة قياسية دقيقة الحجم.

ملعقة صغيرة واحدة تتسع تقريباً لكمية تكفي غطاء زجاجة مياه غازية أو مياه.



3. اغمس الشريط في الماء لمدة 15 ثانية. لا تغمس الشريط في الماء بعد الخطوط المتموجة.




4. أخرج الشريط من الماء وضعه على سطح مستو لمدة دقيقتين.



5. اقرأ النتائج.

**الاجتبار ايجابي:** إذا لم تكن تخطط لاستخدام فينتانيل، فتجنب استخدام المخدرات. إذا كنت تستخدمها، ابدأ بجرعة منخفضة وزدها ببطء.



**نتيجة الاجتبار سلبية:** تذكر أنه لا يوجد اجتبار دقيق بنسبة 100% وقد لا تزال مخدراتك تحتوي على فينتانيل.

**الاجتبار غير صالح:** يشير وجود خط واحد على الجانب الأيمن أو عدم وجود خط على الإطلاق إلى أن الاجتبار غير صالح. أعد اجتبار مخدراتك.

لا يزال خطر الجرعة الزائدة قائماً، حتى إذا لم يكن فينتانيل موجوداً في مخدراتك. اتخذ خطوات لتقليل المخاطر، مثل تجنب خلط العقاقير، وتجنب تعاطي المخدرات بمفردك، وتناول نالوكسون دائماً.

