



# কীভাবে আপনার ওষুধ পরীক্ষা করবেন

## ফেন্টানিল টেস্ট স্ট্রিপগুলি ব্যবহার করে



1. আপনি যে ড্রাগগুলি পরীক্ষা করছেন তা একটি ছোট, অব্যবহৃত পাত্রে রাখুন।  
আপনি যত বেশি ড্রাগ পরীক্ষা করবেন, ফলাফল তত বেশি নির্ভরযোগ্য হবে।




2. আপনার ড্রাগগুলিতে পানি যোগ করুন এবং তাদের মিশ্রিত করুন।

প্রতি 10 মিলিগ্রাম (মিগ্রা) ওষুধের জন্য, ছোট চামচে 1 চামচ জল যোগ করুন,  
যা 5 মিলিলিটারের সমান।

একটি পেনিতে থাকা আব্রাহাম লিংকনের চুল ঢেকে দেওয়ার জন্য  
বা একটি আদর্শ মাইক্রোস্কোপ ভরাট করার জন্য 10 মিগ্রা যথেষ্ট।




1 চা চামচ, প্রায় একটি সোডা বা জলের  
বোতলের ছিপির মতো ধারণ করে।



3. স্ট্রিপটি 15 সেকেন্ডের জন্য জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন। স্ট্রিপটিকে ঢেউ খেলানো  
রেখাগুলির অংশটি পার করে জলে ডুবাবেন না।



4. জল থেকে স্ট্রিপটিকে বের করুন এবং দুই মিনিটের জন্য একটি সমতল  
জায়গায় রাখুন।



5. ফলাফলগুলি পড়ুন।

**পজিটিভ পরীক্ষা:** আপনি যদি ফেন্টানিল ব্যবহার  
করার পরিকল্পনা না করে থাকেন, তাহলে ড্রাগগুলি  
ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। যদি ব্যবহার করে থাকেন,  
তাহলে কম মাত্রা দিয়ে শুরু করুন এবং ধীর গতিতে  
ব্যবহার করুন।



**নেগেটিভ পরীক্ষা:** মনে রাখবেন, কোনো পরীক্ষাই  
100 % সঠিক নয় এবং আপনার ড্রাগগুলিতে এখনও  
ফেন্টানিল থাকতে পারে।



**ভুল পরীক্ষা:** ডানদিকে একটি মাত্র রেখা বা কোনও  
রেখাই না থাকার অর্থ হচ্ছে যে পরীক্ষাটি ভুল। আপনার  
ওষুধগুলি পুনরায় পরীক্ষা করুন।



আপনার ড্রাগগুলিতে ফেন্টানিল না থাকলেও, এখনও বেশি মাত্রা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আপনার ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নিন,  
যেমন ড্রাগগুলি মেশানো এড়ানো, একা ড্রাগ ব্যবহার করা এড়ানো এবং সবসময় ন্যালোক্সোন রাখা।



আরো তথ্যের জন্য, QR কোড স্ক্যান করুন বা  
[nyc.gov/fentanyl](https://nyc.gov/fentanyl)-এ যান।

**NYC**  
Health