



# Jak testować narkotyki

## przy użyciu pasków testowych do sprawdzania obecności fentanylu



### 1. Umieść testowane narkotyki w małym, nieużywanym pojemniku.

Im więcej narkotyków poddasz testowi, tym bardziej wiarygodne będą wyniki.




### 2. Dodaj wodę do narkotyków i wymieszaj je.

Na każde 10 miligramów (mg) narkotyku dodaj 1 łyżeczkę, czyli 5 mililitrów (ml) wody.

10 mg to ilość wystarczająca, by pokryć włosy Abrahama Lincolna na jednym cencie lub wypełnić standardowe szkietko do badania pod mikroskopem.


1 łyżeczka mieści mniej więcej tyle, co nakrętka od butelki wody sodowej lub mineralnej.



### 3. Przytrzymaj pasek zanurzony w wodzie przez 15 sekund. Nie zanurzaj paska w wodzie bardziej niż wskazuje falista linia.



### 4. Wyjmij pasek z wody i umieść go na płaskiej powierzchni na dwie minuty.



### 5. Odczytaj wyniki.

**Pozytywny wynik testu:** Jeśli nie planujesz zażywać fentanylu, nie zażywaj przetestowanych narkotyków. Jeżeli zamierzasz ich używać, zacznij od małych dawek i powoli.



**Negatywny wynik testu:** Pamiętaj, że żaden test nie jest w 100% dokładny i Twoje narkotyki mogą nadal zawierać fentanyl.



**Nieprawidłowy wynik testu:** Pojedyncza linia po prawej stronie lub całkowity brak linii oznacza nieprawidłowy wynik testu. Ponownie przetestuj narkotyki.



Nadal istnieje ryzyko przedawkowania, nawet jeśli w Twoich narkotykach nie ma fentanylu. Podejmij kroki w celu zmniejszenia ryzyka, np. unikaj mieszania narkotyków i zażywania narkotyków w pojedynkę oraz zawsze miej ze sobą nalokson.



W celu uzyskania dodatkowych informacji zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę [nyc.gov/fentanyl](https://nyc.gov/fentanyl).