

Medetomidyna: Poznaj fakty

Co to jest medetomidyna?

- Medetomidyna, nazywana też „rhino tranq” (środek uspokajający dla nosorożców), to weterynaryjny środek uspokajający, który jest silniejszy od ksylazyny. Medetomidyna nie jest opioidem, ale została znaleziona razem z opioidami w narkotykach dostępnych w mieście Nowy Jork.
- Głównym efektem działania medetomidyny jest silne uspokojenie. Może ona również obniżyć ciśnienie krwi i tętno, a to może skutkować takimi objawami, jak zawroty głowy, skrajne zmęczenie, duszność, nudności, nieostre widzenie i dezorientacja.
- Medetomidyna może również powodować poważne objawy odstawienia, które mogą wymagać intensywnej opieki medycznej.




Gdzie się ją znajduje?

Medetomidyna jest znajdowana w narkotykach dostępnych w mieście Nowy Jork od czerwca 2024 r.

- Substancję tę wykryto wyłącznie w narkotykach (opiodach).

Jak działa medetomidyna w przypadku przedawkowania?

Medetomidynę dotychczas znaleziono wyłącznie w opioidach. Osoba, u której wystąpiło przedawkowanie opioidów i medetomidyny, może pozostawać ospała i nie reagować na bodźce nawet po podaniu naloksonu.



Czy nalokson działa na medetomidynę?

Medetomidyna nie jest opioidem, więc nalokson nie odwraca jej działania. Medetomidyna występuje jednak zwykle w opioidach, dlatego jest to ważne, aby mieć nalokson pod ręką i go podać, gdy ktoś zacznie wykazywać objawy przedawkowania. Nawet jeśli dana osoba pozostanie w stanie otępienia wywołanego medetomidyną, nalokson i tak odwróci skutki działania opioidów.

Jak należy reagować na przedawkowanie medetomidyny?

1. Sprawdź, czy dana osoba reaguje.
 - Krzyknij jej do ucha. Jeśli nie zareaguje, potrzyj pięścią okolice mostka.
 - Jeżeli poszkodowana osoba nie zareaguje na pocieranie pięścią mostka, zadzwoń pod numer **911** i podaj nalokson.
2. Zadzwoń pod numer **911** i podaj nalokson.
 - Wykonaj sztuczne oddychanie, zwłaszcza jeśli oddech poszkodowanej osoby został zatrzymany lub jest nieregularny.
 - Jeśli po upływie dwóch, trzech minut poszkodowana osoba nadal nie oddycha, należy jej podać kolejną dawkę naloksonu.
3. Kontynuuj obserwację oddechu tej osoby. Działanie uspokajające narkotyku może się utrzymywać nawet po wznowieniu oddychania.
 - Upewnij się, że dana osoba robi przynajmniej jeden oddech na pięć sekund, a jej skóra nie jest biała, szara ani niebieska.

- Jeśli dana osoba odzyskała oddech, ale nadal jest w stanie uspokojenia, nie ma potrzeby podawania dodatkowych dawek naloksonu.
4. Ułóż osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej (na boku, z ugiętą górną nogą w celu zapewnienia stabilności).
- Pomaga to zapobiec zablokowaniu dróg oddechowych i krążenia.




Jakie są inne skutki zdrowotne medetomidyny?

Wykazano, że medetomidyna powoduje poważne objawy odstawienia u osób zażywających narkotyki. Odstawienie to może być niebezpieczne i wymagać intensywnej opieki medycznej. Objawy obejmują:

- Szybkie tętno (ponad 100 uderzeń na minutę)
- Niebezpiecznie wysokie ciśnienie krwi (180/120 lub wyższe)
- Niekontrolowane nudności i wymioty
- Drżenie
- Nadmierne pocenie się
- Zmieniające się poziomy czujności i dezorientacji

Czy medetomidyna powoduje rany skóry?

Nie. W przeciwieństwie do ksylazyny medetomidyna nie powoduje ran skóry.



Jak można stwierdzić, czy narkotyki zawierają medetomidynę?

Medetomidyna stała się szeroko rozpowszechniona w dostarczanych lokalnie opioidach. Aby dowiedzieć się więcej o zawartości narkotyków, można między innymi:

- Używać pasków testowych do medetomidyny.
- Przynieść swoje narkotyki do punktu kontroli narkotyków w mieście Nowy Jork, aby je przeanalizować i dowiedzieć się więcej o tym, jak zmniejszyć ryzyko.
- Rozmawiać ze znajomymi o tym, jak na nich wpływają narkotyki dostępne na ulicy.

Jak można zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkód wywołanych przyjmowaniem narkotyków zawierających medetomidynę?

- Zaczynaj od małej dawki i sprawdź, jak się czujesz, zanim zażyjesz więcej.
- Unikaj mieszania różnych rodzajów narkotyków.
- Unikaj zażywania w samotności. Jeśli to nie jest możliwe, zadzwoń na infolinię Never Use Alone (877-696-1996) lub na infolinię SafeSpot zajmującą się zapobieganiem przedawkowaniu (800-972-0590).
- Zawsze miej pod ręką nalokson na wypadek przedawkowania opioidów.
- Wybieraj miejsca, w których dłuższe przebywanie w stanie nieprzytomności nie jest niebezpieczne.