

Медетомидин: основные факты

Что представляет собой медетомидин?

- Медетомидин, также известный как «rhino tranq» («транквилизатор для носорогов»), — это седативный препарат, схожий по действию с ксилазином. Медетомидин не является опиоидом, но его обнаруживают как примесь в опиоидах, незаконно циркулирующих в г. Нью-Йорке.
- Основное действие — выраженное седативное (угнетающее) влияние. Он также может снижать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что может вызывать такие симптомы, как головокружение, сильная усталость, одышка, тошнота, затуманенное зрение и спутанность сознания.
- Медетомидин также может вызывать тяжелый синдром отмены, что может потребовать проведения интенсивной медицинской помощи.




Где обнаруживают этот препарат?

Медетомидин обнаруживают в наркотических веществах, незаконно циркулирующих в г. Нью-Йорке, с июня 2024 года.

- Его обнаруживают только в веществах, продаваемых как наркотики, (в опиоидах).

Как медетомидин влияет на передозировку?

На данный момент медетомидин обнаруживают только в составе опиоидных наркотиков. При передозировке с участием опиоидов и медетомидина, человек может оставаться в состоянии седации и не реагировать даже после применения налоксона.



Устраняет ли налоксон действие медетомидина?

Медетомидин не является опиоидом, поэтому налоксон не устраняет его действие. Однако медетомидин обычно подмешивают в опиоиды, поэтому важно иметь при себе налоксон и применять его, если у человека есть признаки передозировки. Налоксон устраняет действие опиоидов, даже если человек остается в состоянии седации из-за медетомидина.

Что делать при передозировке медетомидином?

1. Проверьте реагирует ли человек.
 - Крикните ему в ухо. Если он не реагирует, разотрите его грудную клетку костяшками пальцев (растирание грудины).
 - Если человек не реагирует на растирание грудины, позвоните по номеру **911** и введите налоксон.
2. Позвоните по номеру **911** и введите налоксон.
 - Выполните искусственное дыхание, особенно если дыхание нерегулярное или отсутствует.
 - Если человек не начнет дышать в течение двух-трех минут, введите еще одну дозу налоксона.
3. Продолжайте наблюдать за дыханием человека. Человек может оставаться в состоянии седации даже после восстановления дыхания.
 - Убедитесь, что человек совершает не менее одного вдоха каждые пять секунд и не выглядит бледным, серым или синюшным.

- Если человек остается в состоянии седации, но у него восстановилось дыхание, дополнительные дозы налоксона не требуются.
4. Уложите человека в безопасное положение (положение на боку, лежащая сверху нога должна быть согнута для придания устойчивости).
- Это нужно сделать для того, чтобы дыхательные пути и кровообращение человека не были заблокированы.




Какое еще действие оказывает медемомидин на здоровье?

Наблюдались случаи, когда медемомидин вызывал тяжелый синдром отмены у людей, принимающих наркотики. Такой синдром отмены может быть опасным и потребовать интенсивной медицинской помощи. Он может включать следующие симптомы:

- учащенное сердцебиение (больше 100 ударов в минуту);
- опасное повышение артериального давления (180/120 или выше);
- неконтролируемая тошнота и рвота;
- тремор;
- чрезмерное потоотделение;
- изменение уровня осознанности и спутанность сознания.

Вызывает ли медемомидин образование ран на коже?

Нет. В отличие от ксилазина, случаи образования ран на коже при применении медемомидина не наблюдались.



Как определить, входит ли медемомидин в состав ваших наркотиков?

Медетомидин получил широкое распространение в городе как примесь в опиоидных наркотиках. Ниже перечислены несколько способов узнать, содержится ли медемомидин в составе ваших наркотиков:

- используйте тест-полоски для выявления медемомидина;
- принесите ваши наркотики в пункт проверки наркотиков г. Нью-Йорка, где выполнят анализ их состава и предоставят вам информацию о том, как снизить ваши риски;
- поговорите с вашими знакомыми о том, какое действие оказывают на них уличные наркотики.

Как можно снизить риск вреда от наркотиков, содержащих медемомидин?

- Начните с небольшой дозы и посмотрите, как вы будете себя чувствовать, прежде чем принять больше.
- Не смешивайте разные виды наркотиков.
- Не принимайте наркотики в одиночестве. Если это невозможно, позвоните на горячую линию Never Use Alone (877-696-1996) или на горячую линию по предотвращению передозировки SafeSpot (800-972-0590).
- Всегда держите при себе налоксон на случай передозировки опиоидами.
- Употребляйте наркотики в таком месте, где нет опасности оставаться без сознания в течение длительного времени.

Для получения более подробной информации об услугах, доступных в г. Нью-Йорке, в том числе о пунктах проверки наркотиков, посетите веб-страницу nyc.gov/alcoholanddrugs.