

Medetomidina: Conozca los datos

¿Qué es la medetomidina?

- La medetomidina, también conocida como “rhino tranq” (tranquilizante para rinocerontes), es un sedante de uso veterinario similar a la xilazina. La medetomidina no es un opiáceo, pero se ha encontrado junto con opiáceos en el mercado de drogas en la Ciudad de Nueva York.
- El principal efecto de la medetomidina es una sedación profunda. También puede reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que puede provocar síntomas como mareos, cansancio extremo, dificultad para respirar, náuseas, visión borrosa y confusión.
- La medetomidina también puede provocar síntomas de abstinencia graves que pueden requerir atención médica intensiva.




¿Dónde se ha encontrado?

La medetomidina se ha detectado en el mercado de drogas en la Ciudad de Nueva York desde junio de 2024.

- Solo se ha encontrado en drogas que se venden como opiáceos.

¿Cómo afecta la medetomidina a una sobredosis?

Hasta ahora, la medetomidina solo se ha encontrado en el suministro de opiáceos. Una persona que sufra una sobredosis por una mezcla de opiáceos y medetomidina podría permanecer sedada y sin responder, incluso después de recibir naloxona.



¿Funciona la naloxona con la medetomidina?

La medetomidina no es un opiáceo, por lo que la naloxona no revierte sus efectos. Sin embargo, la medetomidina suele administrarse junto con opiáceos, por lo que es importante tener naloxona a mano y utilizarla si alguien muestra signos de sobredosis. La naloxona revertirá los efectos de los opiáceos, incluso si la persona permanece sedada por la medetomidina.

¿Cómo debe actuar ante una sobredosis de medetomidina?

1. Asegúrese que la persona responda.
 - Grítele al oído. Si no responde, oprima sus nudillos contra el esternón (frote el esternón).
 - Si la persona no responde al masaje en el esternón, llame al **911** y adminístrele naloxona.
2. Llame al **911** y adminístrele naloxona.
 - Realice la respiración de boca a boca, sobre todo si la persona no respira o su respiración es irregular.
 - Si la persona sigue sin respirar al cabo de dos o tres minutos, adminístrele otra dosis de naloxona.
3. Siga observando la respiración de la persona. Es posible que siga sedada incluso después de que recupere la respiración.
 - Asegúrese de que la persona respire al menos una vez cada cinco segundos y de que no tenga el rostro pálido, grisáceo o azulado.
 - Si la persona ha recuperado la respiración pero sigue sedada, no es necesario administrarle dosis adicionales de naloxona.

4. Coloque a la persona en posición lateral de recuperación (de lado, con la pierna de arriba flexionada para mayor estabilidad).

- Esto ayuda a asegurar que no se obstruyan las vías respiratorias ni la circulación de la persona.



¿Cuáles otros efectos tiene la medetomidina en la salud?


Se ha demostrado que la medetomidina provoca síntomas de abstinencia graves en las personas que consumen drogas. Esta abstinencia puede ser peligrosa y requerir atención médica intensiva. Síntomas:

- Frecuencia cardíaca acelerada (más de 100 latidos por minuto)
- Presión arterial peligrosamente alta (180/120 o más)
- Náuseas y vómitos incontrolables
- Temblor
- Sudoración excesiva
- Cambios en los niveles de estado de alerta y confusión



¿La medetomidina provoca heridas en la piel?

No. A diferencia de la xilazina, no se ha demostrado que la medetomidina cause heridas en la piel.



¿Cómo puede una persona saber si hay medetomidina en sus drogas?

La medetomidina se ha vuelto común en el suministro local de opioides. Algunas formas de saber qué contienen sus drogas:

- Use tiras de prueba para detectar medetomidina.
- Lleve sus drogas a un punto de análisis de drogas de la Ciudad de Nueva York para que las analicen e infórmese sobre cómo reducir los riesgos.
- Hable con sus conocidos sobre cómo les hacen sentir las drogas que circulan en la calle.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de sufrir efectos adversos por el consumo de drogas que contienen medetomidina?

- Empiece con una pequeña cantidad y espere a ver cómo se siente antes de consumir más.
- Evite mezclar diferentes tipos de drogas.
- Evite consumir solo. Si eso no es posible, llame a la línea directa Never Use Alone (877-696-1996) o a la línea directa para la prevención de una sobredosis SafeSpot (800-972-0590).
- Tenga siempre naloxona a mano en caso de una sobredosis de opioides.
- Consuma en un lugar donde no sea peligroso permanecer inconsciente durante mucho tiempo.