

聽說過美托咪定嗎？

它是什麼？

美托咪定 (Medetomidine, 又稱「犀牛鎮靜劑」) 是一種獸用鎮靜劑, 其藥效比賽拉嗒 (xylazine) 更強。

在哪裡？

美托咪定經常出現在紐約市檢測的毒品樣本中。

有何作用？

美托咪定可導致長時間沉睡或嗜睡、血壓低以及顫抖。

有何須知？

美托咪定的戒斷反應發作可非常迅速, 程度可以非常嚴重。患者有時需要入院治療。

美托咪定戒斷反應與就醫時機

美托咪定戒斷可能導致：

- 心跳極快
- 血壓極高
- 清醒時也會出現意識模糊或者時而清醒、時而恍惚的狀態
- 大量出汗
- 顫抖或抽搐
- 焦慮與坐立不安

需要就醫的症狀：

- 嘔吐不止
- 出現胸痛
- 清醒時也會出現意識模糊或者時而清醒、時而恍惚的狀態
- 出現異常嚴重的戒斷症狀

如需更多資訊與減害資源，請造訪：
nyc.gov/alcoholanddrugs。

本卡改編自費城公共衛生局 (Philadelphia Department of Public Health) 編製的資料，
2026 年 2 月製作。

NYC
Health

Traditional Chinese