

Avez-vous déjà entendu parler de la **médétomidine** ?

De quoi s'agit-il ?

La médétomidine, ou « rhino tranq », est un sédatif vétérinaire plus puissant que la xylazine.

Où en trouve-t-on ?

La médétomidine a été régulièrement détectée dans les échantillons de drogue analysés dans la ville de New York.

Quels en sont les effets ?

La médétomidine peut provoquer un sommeil profond ou une somnolence prolongée, de l'hypotension, et des tremblements.

Que devez-vous savoir ?

Le sevrage de la médétomidine peut démarrer rapidement et être particulièrement difficile à endurer. Parfois, les personnes ont besoin de se rendre à l'hôpital.

Sevrage de la médétomidine et quand se rendre à l'hôpital

Le sevrage de la médétomidine peut provoquer :

- Battements cardiaques extrêmement rapides
- Hypertension extrêmement élevée
- Alternances de périodes de conscience ou de réponse et de périodes d'inconscience ou de non-réponse, même à l'état d'éveil
- Sueurs abondantes
- Tremblements et contractions musculaires
- Anxiété et agitation

Signes indiquant qu'il est impératif de se rendre à l'hôpital :

- Impossible d'arrêter de vomir
- Douleurs à la poitrine
- Alternances de périodes de conscience ou de réponse et de périodes d'inconscience ou de non-réponse, même à l'état d'éveil
- Autres symptômes de sevrage plus intenses que d'habitude

Pour obtenir davantage d'informations et de ressources sur la réduction des risques, consultez nyc.gov/alcoholanddrugs.



Cette carte a été adaptée à partir de documents élaborés par le Département de la santé publique de Philadelphie.
Création : février 2026