

Ha mai sentito parlare della **medetomidina**?

Che cos'è?

La medetomidina, nota anche come “tranquillante per rinoceronti”, è un sedativo per uso veterinario più potente della xilazina.

Dove si trova?

La medetomidina è stata trovata regolarmente nei campioni dei test tossicologici effettuati nella Città di New York.

Che cosa provoca?

La medetomidina può causare sonno profondo o sonnolenza per un lungo periodo di tempo, abbassamento della pressione e tremori.

Che cosa si deve sapere?

L'astinenza da medetomidina può insorgere rapidamente ed essere molto grave. Sono frequenti gli accessi al pronto soccorso.

Astinenza da medetomidina e quando recarsi al pronto soccorso

L'astinenza da medetomidina può provocare:

- Tachicardia molto forte
- Grave ipertensione
- Stato confusionale acuto
- Forte sudorazione
- Tremori o spasmi
- Ansia e irrequietezza

Condizioni che richiedono l'accesso al pronto soccorso:

- Vomito incoercibile
- Dolore toracico
- Stato confusionale acuto
- Sintomi di astinenza più gravi del solito

Per ulteriori informazioni e suggerimenti per la limitazione dei danni visitare nyc.gov/alcoholanddrugs.



La presente scheda è stata adattata dalla documentazione prodotta dal Dipartimento della sanità di Philadelphia.
Data di pubblicazione febbraio 2026.