

Czy wiesz, co to **medetomidyna**?

Co to jest?

Medetomidyna to weterynaryjny środek uspokajający, który jest silniejszy od ksylazyny.

Gdzie występuje?

Medetomidynę regularnie wykrywa się w próbkach narkotyków badanych w mieście Nowy Jork.

Co powoduje?

Medetomidyna może powodować głęboki sen lub długotrwałą senność, niskie ciśnienie krwi i drżenie.

Co trzeba wiedzieć?

Objawy odstawienia medetomidyny mogą wystąpić bardzo szybko i mieć poważne konsekwencje. Czasami wymagają hospitalizacji.

Odstawienie medetomidyny i kiedy należy udać się do szpitala

Odstawienie medetomidyny może powodować:

- Bardzo szybkie bicie serca
- Bardzo wysokie ciśnienie krwi
- Przejściowe braki reakcji lub świadomości nawet bez zasypiania
- Silne pocenie się
- Drżenia lub skurcze
- Lęk i niepokój

Objawy wymagające udania się do szpitala:

- Nieustające wymioty
- Ból w klatce piersiowej
- Przejściowe braki reakcji lub świadomości nawet bez zasypiania
- Inne, cięższe niż zwykle objawy odstawienia

W celu uzyskania dodatkowych informacji i zasobów dotyczących ograniczania szkód odwiedź stronę nyc.gov/alcoholanddrugs.



Tę kartę zaadaptowano na podstawie materiałów opracowanych przez Wydział Zdrowia Publicznego w Filadelfii.
Opracowano w lutym 2026 r.

Polish