

¿Ha oído hablar de la medetomidina?

¿Qué es?

La medetomidina, o “tranquilizante para rinocerontes”, es un sedante veterinario más potente que la xilazina.

¿Dónde está?

La medetomidina se ha encontrado con regularidad en muestras de drogas analizadas en la ciudad de Nueva York.

¿Qué hace?

Puede provocar sueño profundo o somnolencia durante mucho tiempo, presión arterial baja y temblores.

¿Qué necesita saber?

La abstinencia de medetomidina puede comenzar rápidamente y ser muy grave. A veces requiere hospitalización.

La abstinencia de la medetomidina y cuándo ir al hospital

La abstinencia de la medetomidina puede provocar:

- Ritmo cardíaco muy acelerado
- Presión arterial muy alta
- Entrar y salir de la conciencia o de la capacidad de responder, aun estando despierto
- Sudoración excesiva
- Temblores o espasmos
- Ansiedad y agitación

Señales para ir al hospital:

- Vómitos incontrolables
- Dolor en el pecho
- Entrar y salir de la conciencia o de la capacidad de responder, aun estando despierto
- Tener síntomas de abstinencia más graves de lo habitual

Para más información y recursos de reducción de daños, visite nyc.gov/alcoholanddrugs.



Esta tarjeta fue adaptada a partir de materiales desarrollados por el Departamento de Salud Pública de Filadelfia.
Fecha de creación: febrero de 2026

Spanish