

Informacje o naloksonie

Nalokson jest bezpiecznym lekiem, który może odwrócić skutki przedawkowania opioidów.

Działa tylko na opioidy, (takie jak heroina, leki przeciwbólowe na receptę i fentanyl), ale można go bezpiecznie stosować, nawet jeśli nie zażyto opioidów.

Ważne: Powiedz innym, gdzie nalokson jest przechowywany i jak go używać.

Sprawdzanie, czy doszło do przedawkowania

Objawy przedawkowania opioidów obejmują:

- Brak reakcji lub utrata przytomności
- Powolne lub zatrzymane oddychanie
- Niebieskie, szare lub białe usta lub opuszki palców
- Chrapanie lub odgłosy bulgotania

Przed podaniem naloksonu należy sprawdzić, czy osoba reaguje:

- Głośno krzyknąć, aby sprawdzić, czy osoba reaguje.
- Jeśli nie ma reakcji, wbić knykcie w ich mostek (uciskanie mostka pięścią).

Jeśli nie ma reakcji na uciskanie mostka pięścią, jest to sytuacja awaryjna!



Kroki reagowania przy przedawkowaniu

1. Zadzwoń pod numer **911** w celu uzyskania pomocy medycznej. Powiedz, że osoba nie odycha.
2. Podaj nalokson. Nie testuj urządzenia, ponieważ można go użyć tylko raz.



Zerwij

Umieść

Naciśnij

Nie wymaga ono montażu. Rozpyl nalokson w jednym nozdrzu, naciskając tłok.


Jeśli w ciągu dwóch minut nie ma reakcji, podaj drugą dawkę.

3. Wykonaj oddechy ratownicze lub reanimację tak szybko, jak to możliwe. Zestaw naloksonu zawiera osłonę na twarz.

- Odchyl głowę osoby do tyłu i uciśnij jej nos.
- Wykonaj dwa oddechy i i obserwuj, czy klatka piersiowa podosi się.
- Kontynuuj wykonywanie jednego oddechu.



4. Jeśli nie podasz naloksonu lub oddechów ratowniczych, połóż osobę na boku, aby zapobiec zadławieniu.



Po podaniu naloksonu

Pozostań przy osobie do czasu przybycia pomocy medycznej.

- Nalokson działa przez 30 do 90 minut i może powodować objawy odstawienia, dopóki nie przestanie działać.
- Zastosowanie większej ilości leku nie zmniejszy objawów odstawienia, a może zwiększyć ryzyko kolejnego przedawkowania.

Zgłoś użycie naloksonu przedstawicielom programu od którego go otrzymałeś, lub skorzystaj z aplikacji Stop OD NYC.

Uzyskaj nowy zestaw, jeśli użyjesz jednej lub więcej dawek, lub gdy kończy się termin ważności naloksonu.

Wsparcie

Skontaktuj się z infolinią NYC Well pod numerem 888-692-9355, aby znaleźć nalokson bądź uzyskać wsparcie w zakresie używania substancji lub zdrowia psychicznego.

NYC
Health

NYC
Health

Czym jest nalokson?
What Is Naloxone?

