

# Zgony z powodu przedawkowania wśród czarnoskórych nowojorczyków, 2022 r.


**1032** czarnoskórych nowojorczyków zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Wśród czarnoskórych nowojorczyków odnotowano trzecią największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.




**62,0** czarnoskórych nowojorczyków na 100 000 zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Wśród czarnoskórych nowojorczyków odnotowano najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania (na 100 000 mieszkańców).




Odsetek zgonów z powodu przedawkowania wśród czarnoskórych nowojorczyków był najwyższy u mężczyzn i osób w wieku od 55 do 84 lat.


■ Czarnoskórzy nowojorczycy □ Miasto Nowy Jork




Największą liczbę zgonów spowodowanych przedawkowaniem wśród czarnoskórych mieszkańców odnotowano w dzielnicy Bronx.



Najwyższy współczynnik zgonów spowodowanych przedawkowaniem wśród czarnoskórych mieszkańców odnotowano w dzielnicy Manhattan.



Substancje, których dotyczyły zgony z powodu przedawkowania narkotyków wśród czarnoskórych nowojorczyków (mogą dotyczyć więcej niż jednej substancji):



**Źródło:** Dane dotyczące śmiertelności z powodu przedawkowania ograniczono do osób w wieku od 15 do 84 lat i zaczerpnięto z New York City Office of the Chief Medical Examiner (Urzędu Głównego Egzaminatora Medycznego miasta Nowy Jork) i New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics (Biura Istotnych Danych Statystycznych Wydziału Zdrowia i Higieny Psychiczej miasta Nowy Jork), 2022 r. Analiza przeprowadzona przez Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (Biuro ds. Alkoholu, Używania Narkotyków, Profilaktyki, Opieki i Leczenia). Dane za rok 2022 są prowizoryczne i mogą ulec zmianie.