


# 2021 年紐約拉丁裔居民用藥過量死亡狀況

雖然拉丁裔人群常被描述為一個單一群體，但紐約市 (NYC) 的拉丁裔人群卻代表了 20 多個不同的原籍國或傳統群體。本件著重列出紐約市最大的拉丁裔傳統群體（波多黎各群體、多米尼加群體、中美洲和南美洲群體及墨西哥群體）之間在用藥過量死亡方面的差異。


紐約拉丁裔居民用藥過量死亡人數最多。




紐約拉丁裔居民用藥過量死亡率（按每 100,000 人計算）位居第二。



紐約拉丁裔人群占紐約市人口 28%。紐約市最大的拉丁裔傳統群體為波多黎各群體和多米尼加群體。




紐約拉丁裔居民在用藥過量死亡人群中占比為 34%。與人口估計相比，紐約波多黎各居民用藥過量死亡人數比例較高。




**數據來源：**人口統計基準估計值來自綜合公共應用微觀數據系列 (Integrated Public Use Microdata Series) 和美國人口普查局美國社區調查報告 (U.S. Census American Community Survey)，2016-2020 年數據。拉丁裔人群統計基準值來自紐約市健康與心理衛生局（紐約市衛生局）的人口估計，該數值經過對美國人口普查局 (U.S. Census Bureau) 的插值間隔人口估計數進行修訂而得出，2000-2020 年數據（於 2021 年 10 月更新）。用藥過量死亡數據限於 15 至 84 歲人群，來源為紐約市首席法醫辦公室 (NYC Office of the Chief Medical Examiner) 和紐約市衛生局人口動態統計處 (Bureau of Vital Statistics)，2021 年數據。為了本刊的出版，使用了死亡證書上報告的拉丁裔傳統群體資訊，若該資訊未有報告，則被描述為缺失。數據由酒精、毒品使用、預防、照護和治療局 (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment) 做出分析。2021 年數據屬臨時性，可能順時變動。

在紐約拉丁裔居民中，紐約波多黎各居民死於用藥過量的人數最多。每三個死於用藥過量的紐約拉丁裔居民中，有一人的死亡證書中缺失了傳統群體資訊。




紐約波多黎各居民的用藥過量死亡率高於紐約拉丁裔居民的總體用藥過量死亡率。



\*數據缺失，比例無法計算。

紐約波多黎各居民的用藥過量死亡率在 35 至 54 歲的男性群體中最高。

■ 拉丁裔 □ 波多黎各群體



紐約拉丁裔居民用藥過量死亡所涉及的物質（用藥過量死亡可能源於一種以上的物質）：

