



2021 年纽约拉丁裔居民用药过量死亡状况

虽然拉丁裔人群常被描述为一个单一群体，但纽约市 (NYC) 的拉丁裔人群却代表了 20 多个不同的原籍国或传统群体。本件着重列出纽约市最大的拉丁裔传统群体（波多黎各群体、多米尼加群体、中美洲和南美洲群体及墨西哥群体）之间在用药过量死亡方面的差异。

纽约拉丁裔居民用药过量死亡人数最多。




纽约拉丁裔居民用药过量死亡率（按每 100,000 人计算）位居第二。




纽约拉丁裔人群占纽约市人口 28%。

纽约市最大的拉丁裔传统群体为波多黎各群体和多米尼加群体。




纽约拉丁裔居民在用药过量死亡人群中占比为 34%。与人口估计相比，纽约波多黎各居民用药过量死亡人数比例较高。




数据来源：人口统计基准估计值来自综合公共应用微观数据系列 (Integrated Public Use Microdata Series) 和美国人口普查局美国社区调查报告 (U.S. Census American Community Survey), 2016-2020 年数据。拉丁裔人群统计基准值来自纽约市健康与心理卫生局 (纽约市卫生局) 的人口估计, 该数值经过对美国人口普查局 (U.S. Census Bureau) 的插值间隔人口估计数进行修订而得出, 2000-2020 年数据 (于 2021 年 10 月更新)。用药过量死亡数据限于 15 至 84 岁人群, 来源为纽约市首席法医办公室 (NYC Office of the Chief Medical Examiner) 和纽约市卫生局人口动态统计处 (Bureau of Vital Statistics), 2021 年数据。为了本刊的出版, 使用了死亡证书上报告的拉丁裔传统群体信息, 若该信息未有报告, 则被描述为缺失。数据由酒精、毒品使用、预防、护理和治疗局 (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment) 做出分析。2021 年数据属临时性, 可能顺时变动。

在纽约拉丁裔居民中，纽约波多黎各居民死于用药过量的人数最多。每三个死于用药过量的纽约拉丁裔居民中，有一人的死亡证书中缺失了传统群体信息。




纽约波多黎各居民的用药过量死亡率高于纽约拉丁裔居民的总体用药过量死亡率。



*数据缺失，比例无法计算

纽约波多黎各居民用药过量死亡率在 35 至 54 岁的男性群体中最高。

■ 拉丁裔 □ 波多黎各群体



纽约拉丁裔居民用药过量死亡所涉及的物质（用药过量死亡可能源于一种以上的物质）：

