


Zgony z powodu przedawkowania wśród nowojorczyków pochodzenia latynoskiego, 2022 r.

Chociaż często określa się ich jako jedną grupę, Latynosi w mieście Nowy Jork (NYC) reprezentują ponad 20 różnych krajów lub grup pochodzenia¹. Niniejsza karta informacyjna wskazuje różnice w liczbie zgonów z powodu przedawkowania wśród największych społeczności latynoskich w NYC: Portorykańczyków, Dominikańczyków, mieszkańców Ameryki Środkowej i Południowej oraz Meksykanów.


Wśród nowojorczyków pochodzenia latynoskiego odnotowano drugą największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.




Wśród nowojorczyków pochodzenia latynoskiego odnotowano drugi najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania (na 100 000 mieszkańców).



Nowojorczyki pochodzenia latynoskiego stanowią 28% populacji NYC. Największe grupy pochodzenia latynoskiego w NYC to Portorykańczyki i Dominikańczyki.




Nowojorczyki pochodzenia latynoskiego stanowią 34% ofiar śmiertelnych przedawkowania. W porównaniu z wartościami szacunkowymi populacji, najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród nowojorczyków pochodzenia portorykańskiego.




¹ Do celów niniejszej publikacji pochodzenie latynoskie jest stwierdzane na podstawie aktu zgonu. Jeśli informacja ta nie została zgłoszona, jest oznaczona jako brakująca.

Źródło: Wartości szacunkowe dotyczące wielkości populacji pochodzą z badania Integrated Public Use Microdata Series, U.S. Census American Community Survey, 2016–2020. Dane dotyczące wielkości populacji latynoskiej pochodzą z NYC Department of Health and Mental Hygiene (Wydziału Zdrowia i Higieny Psychiczej NYC) i zostały zmodyfikowane na podstawie interpolowanych międzyokresowych wartości szacunkowych populacji U.S. Census Bureau, 2000–2020 (aktualizacja z października 2021 r.). Dane dotyczące śmiertelności z powodu przedawkowania ograniczono do osób w wieku od 15 do 84 lat i zaczerpnięto z NYC Office of the Chief Medical Examiner (Urzędu Głównego Egzaminatora Medycznego NYC) Jork i NYC Health Department's Bureau of Vital Statistics (Biura Istotnych Danych Statystycznych Wydziału Zdrowia NYC), 2022 r. Analiza przeprowadzona przez Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (Biuro ds. Alkoholu, Używania Narkotyków, Profilaktyki, Opieki i Leczenia). Dane za rok 2022 są prowizoryczne i mogą ulec zmianie.

Wśród nowojorczyków pochodzenia portorykańskiego najczęściej zgonów z powodu przedawkowania odnotowano u Portorykańczyków. W aktach zgonu co trzeciego nowojorczyka pochodzenia portorykańskiego, który zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków, brakowało informacji o pochodzeniu.




Odsetek zgonów z powodu przedawkowania wśród nowojorczyków pochodzenia portorykańskiego był wyższy niż całkowity odsetek wśród wszystkich nowojorczyków pochodzenia latynoskiego.



* W przypadku braku danych dotyczących pochodzenia nie można obliczyć odsetka.

Wskaźnik zgonów spowodowanych przedawkowaniem wśród portorykańskich mieszkańców Nowego Jorku był najwyższy wśród mężczyzn i osób w wieku od 35 do 54 lat.



Substancje, których dotyczyły zgony z powodu przedawkowania wśród nowojorczyków pochodzenia latynoskiego (mogą dotyczyć więcej niż jednej substancji):

