


Zgony z powodu przedawkowania wśród mieszkańców dzielnicy Bronx, 2022 r.


831 mieszkańców dzielnicy Bronx zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Wśród mieszkańców dzielnicy Bronx odnotowano największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.




73,6 mieszkańców dzielnicy Bronx na 100 000 zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.


Wśród mieszkańców dzielnicy Bronx odnotowano najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania (na 100 000 mieszkańców).



Największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród mieszkańców dzielnicy Bronx w wieku od 35 do 54 lat.




Najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród mieszkańców dzielnicy Bronx w wieku od 55 do 84 lat.




Największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród mieszkańców dzielnicy Bronx pochodzenia latynoskiego.



Najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania odnotowano wśród białych mieszkańców dzielnicy Bronx.



Substancje, których dotyczyły zgony z powodu przedawkowania narkotyków wśród białych nowojorczyków (mogą dotyczyć więcej niż jednej substancji):



Źródło: Biuro Głównego Lekarza Medycyny Sądowej (Office of the Chief Medical Examiner) miasta Nowy Jork i Urzędu ds. Danych Demograficznych (Bureau of Vital Statistics) Wydziału Zdrowia i Higieny Psychiczej miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental Hygiene), 2022 r. Analiza przeprowadzona przez Biuro ds. Alkoholu, Używania Narkotyków, Profilaktyki, Opieki i Leczenia (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). Dane za rok 2022 są prowizoryczne i mogą ulec zmianie.