


# Zgony z powodu przedawkowania wśród mieszkańców Staten Island, 2021 r.


**146** mieszkańców Staten Island zmarło z powodu przedawkowania.

Wśród mieszkańców Staten Island odnotowano najmniejszą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.




**39,3** mieszkańców na 100 000 zmarło z powodu przedawkowania.


Wśród mieszkańców Staten Island odnotowano drugi najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania (na 100 000 mieszkańców).




Wśród mieszkańców Staten Island w wieku od 35 do 54 lat odnotowano największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.




Wśród mieszkańców Staten Island w wieku od 35 do 54 lat odnotowano najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania.




Wśród białych mieszkańców Staten Island odnotowano największą liczbę zgonów z powodu przedawkowania.



Wśród białych mieszkańców Staten Island odnotowano najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania.



Substancje, których dotyczyły zgony z powodu przedawkowania narkotyków (mogą one dotyczyć więcej niż jednej substancji):



Źródło: Biuro Głównego Egzaminatora Medycznego miasta Nowy Jork (Office of the Chief Medical Examiner) i Urząd ds. Danych Demograficznych (Bureau of Vital Statistics) Wydział Zdrowia i Higieny Psychiczej miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental Hygiene), 2021. Analiza Biura ds. Alkoholu, Używania Narkotyków, Profilaktyki, Opieki i Leczenia (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). Dane za rok 2021 są szacunkowe i mogą ulec zmianie.