


Staten Island کے رہائشیوں میں منشیات کی زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے اموات، 2021

رہائشی فی 100,000 منشیات کی زیادہ مقدار لینے سے جان بحق ہوئے۔

39.3


Staten Island رہائشیوں میں زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے اموات کی شرح میں دوسرے نمبر پر تھا (فی 100,000 رہائشی)۔




Staten Island کے رہائشی منشیات کی زیادہ مقدار لینے سے جان بحق ہوئے۔

146


Staten Island کے رہائشیوں میں زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے اموات کی تعداد سب سے کم تھی۔




Staten Island کے 35 سے 54 سال کی عمر کے رہائشیوں میں زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے موت کی شرح سب سے زیادہ تھی۔




Staten Island کے 35 سے 54 سال کی عمر کے رہائشیوں میں زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں۔




Staten Island کے سفید فام رہائشیوں میں زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے اموات کی شرح سب سے زیادہ تھی۔



Staten Island کے سفید فام رہائشیوں میں زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے اموات کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔



منشیات کی زیادہ مقدار لینے سے ہونے والی اموات میں شامل مادے (زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے ہونے والی اموات میں ایک سے زیادہ مادے شامل ہو سکتے ہیں):



حوالہ: نیو یارک سٹی دفتر برائے چیف میڈیکل ایگز امینر اور نیویارک سٹی محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت کا بیورو برائے اہم اعداد و شمار (Bureau of Vital Statistics)، 2021۔ تجزیہ منجانب بیورو برائے الکحل، منشیات کے استعمال، روک تھام، نگہداشت اور علاج (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment)۔ 2021 کا ڈیٹا غیر حتمی ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔