



# শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে ওভারডোজের কারণে মৃত্যু, 2021

**763** শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসী ওষুধের ওভারডোজের কারণে মারা গেছেন।

**36.2** জন শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসী প্রতি 100,000 জনের মধ্যে


শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে ওষুধের ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ।




পুরুষ ও 35 থেকে 54 বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে ওভারডোজের কারণে মৃত্যুর হার ছিল


■ শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসী □ নিউ ইয়র্ক সিটি




Brooklyn-এ শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।



Bronx-এ শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে ওষুধের ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ।



শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে ওষুধের ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুর সাথে জড়িত পদার্থসমূহ (ওভারডোজ-জনিত মৃত্যুতে একাধিক পদার্থ জড়িত থাকতে পারে):



**উৎস:** ওভারডোজের কারণে মৃত্যু সংক্রান্ত ডেটা 15 থেকে 84 বছর বয়সী লোকদের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং তা নিউ ইয়র্ক শহরের মুখ্য চিকিৎসাগত পরীক্ষকের দপ্তর (New York City Office of the Chief Medical Examiner) এবং নিউ ইয়র্ক শহরের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান ব্যুরো (New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics), 2021 থেকে নেওয়া হয়েছে। অ্যালকোহল, ওষুধের ব্যবহার, প্রতিরোধ, পরিচর্যা ও চিকিৎসা বিষয়ক ব্যুরো (Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment)-এর বিশ্লেষণ। 2021 সালের এই ডেটা সাময়িক এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ।