

الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك من البيض، لعام 2022

من سكان مدينة نيويورك من البيض من بين كل 100000 من السكان تناولوا جرعة زائدة من العقاقير. **36.5**


من سكان مدينة نيويورك من البيض توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **772**

سجل سكان مدينة نيويورك البيض ثالث أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).


سجل سكان مدينة نيويورك من البيض أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




كان أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك من البيض من نصيب الذكور والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا.




سجلت Bronx أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بين السكان البيض.



سجلت Brooklyn أكبر عدد لحالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بين السكان البيض.



المواد المرتبطة بحالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة من العقاقير بين سكان مدينة نيويورك من البيض (من الممكن أن ترتبط حالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: اقتصر على بيانات الوفيات الناتجة عن تناول الجرعات الزائدة على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و84 عامًا، وقد حُصل عليها من Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2022. وقد تم تحليل البيانات بواسطة Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات تعاطي الكحول والعقاقير). البيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.

NYC
Health