



# শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের ওভারডোজের কারণে মৃত্যু, 2022

**772** শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্ক বাসী বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মারা যায়।


**36.5** 100,000 শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্ক বাসী পিছু বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মারা যায়।

শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের ড্রাগ ওভারডোজের কারণে হওয়া মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল।

শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্ক বাসীদের বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যুর হার ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ (100,000 জন বাসিন্দা পিছু)।





শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্ক বাসীদের মধ্যে বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যুর হার পুরুষ এবং 35 থেকে 54 বছর বয়সী মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।




শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের মধ্যে বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা Brooklyn এ সবচেয়ে বেশি।

শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের মধ্যে বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যুর হার Bronx এ সবচেয়ে বেশি।



শ্বেতাঙ্গ নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে বেশি মাত্রায় যে সব ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে (বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যু একাধিক ড্রাগ নেওয়ার কারণেও হতে পারে):



**উৎস:** বেশি মাত্রায় ড্রাগ নেওয়ার কারণে মৃত্যুর হারের ডেটা 15 থেকে 84 বছর বয়সী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিউ ইয়র্ক সিটি অফিসের মুখ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষক এবং নিউ ইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যুরো, 2022 থেকে নেওয়া হয়েছিল। মদ, ড্রাগ ব্যবহার, প্রতিরোধ, পরিচর্যা এবং চিকিৎসা ব্যুরো দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়। 2022 এর জন্য ডেটা অস্থায়ী এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ।

