

# 자일라진이 무엇입니까?

일반적으로 '트랭크'라고 알려진 자일라진은 수의사가 동물의 긴장을 풀어주고 진정시키기 위해 사용하는 약물입니다. 오피오이드가 아닙니다. 자일라진은 거의 항상 펜타닐(강력한 합성 오피오이드)과 함께 뉴욕시(NYC)약물 공급처에서 발견되었습니다.



## 자일라진의 부작용은 무엇입니까?

자일라진은 졸음, 무반응, 저혈압, 심박수 감소 및 호흡 저하를 유발할 수 있습니다.



## 자일라진은 사람에게 사용하도록 승인되었습니까?

아니요. 자일라진은 동물에만 사용하도록 식품의약국(Food and Drug Administration)의 승인을 받았습니다.



## 자일라진이 또 발견된 곳은 어디입니까?

자일라진은 미국 몇몇 주와 푸에르토리코의 약물 공급처에서 발견되었습니다.




## 자일라진은 일반적으로 단독으로 발견됩니까, 아니면 다른 약물과 함께 발견됩니까?

뉴욕시에서 자일라진은 펜타닐도 포함된 약물에서만 발견되었습니다.



## 자일라진이 주로 펜타닐과 함께 발견되는 이유는 무엇입니까?

펜타닐의 효과는 다른 오피오이드(예: 헤로인)의 효과만큼 오래 지속되지 않습니다. 펜타닐에 자일라진을 추가하면 효과가 지속되는 시간을 늘릴 수 있습니다. 대부분의 사람들은 약물에 자일라진이 들어 있다는 것을 모릅니다.



## 자일라진을 과다 복용할 수 있습니까?

예. 자일라진을 매우 많이 복용하면 극심한 진정 작용, 심박수 감소, 호흡 저하 또는 정지를 유발할 수 있습니다.



## 날록손은 자일라진에 효과가 있습니까?

자일라진은 오피오이드가 아니므로 날록손이 역효과를 유발하지 않습니다. 그러나 자일라진은 거의 항상 오피오이드와 함께 발견됩니다. 누군가 과다 복용하고 있다고 생각되면 날록손을 투여하고 **911**번으로 전화하십시오. 환자가 자일라진으로 인해 진정 상태를 유지하더라도 날록손은 오피오이드의 역효과를 유발합니다.



## 어떤 사람이 자일라진을 사용하고 오피오이드 과다 복용으로 날록손을 받은 경우 어떻게 됩니까?

환자는 다시 호흡을 시작할 수 있지만 여전히 자일라진으로 진정됩니다. 환자가 숨을 쉬고 있으면 (옆으로 눕힌 상태에서) 구조 자세를 취하게 두고 도움을 받을 때까지 기다립니다. 맥박산소포화도측정기가 있는 경우 이 기기를 사용하여 환자의 산소 수치를 모니터링하십시오.



## 자일라진의 다른 효과는 무엇입니까?

정기적으로 자일라진을 사용하는 사람은 자일라진을 주사 하지 않아도 (예: 흡연 또는 코로 흡입하더라도) 심각한 피부 궤양과 종기가 생길 수 있습니다. 자일라진을 사용하여 생긴 피부 상처는 다른 피부 상처보다 더 빨리 악화되고 치유하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.



## 사람들이 자일라진 금단 현상을 겪을 수 있습니까?

예. 자일라진을 정기적으로 사용하는 사람들은 금단 현상을 겪을 위험이 있습니다. 증상으로는 짜증, 불안, 불편함, 심박수 증가 및 고혈압이 있습니다.



## 자일라진과 관련하여 약물을 테스트하는 방법이 있습니까?

환자들은 다음과 같이 주사기 서비스 프로그램에 연락하고 방문하여 소지한 약물에 대해 자일라진 테스트를 받고 피해 감소 서비스를 받을 수 있습니다.

- **OnPoint NYC:** [onpointnyc.org](http://onpointnyc.org)를 참조하거나 212-828-8464번으로 전화하십시오.
- **St. Ann's Corner of Harm Reduction:** [sachr.org](http://sachr.org)를 참조하거나 718-585-5544 번으로 전화하십시오.
- **Housing Works:** [housingworks.org](http://housingworks.org)를 참조하거나 347-473-7400번으로 전화하십시오.
- **VOCAL-NY:** [vocal-ny.org](http://vocal-ny.org)를 참조하거나 718-802-9540번으로 전화하십시오.

사람들은 개인적인 용도로 제조업체에서 온라인으로 자일라진 테스트 스트립을 주문할 수도 있습니다.



## 어떻게 하면 사람들이 자일라진으로 인해 피해를 입을 위험을 줄일 수 있습니까?

약물에 자일라진이 포함되어 있다는 것을 알고 있거나 포함되어 있다고 생각하는 경우:

- 특히 혼자 있거나 오랫동안 의식을 잃으면 위험할 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 감독하에 사용하기 위해 약물을 과다 복용 예방 센터로 가져가십시오.

피부에 상처가 있는 경우 자일라진 사용을 중단하면 상처를 치유하는 데 도움이 될 수 있습니다. 개선되지 않거나 없어지지 않는 피부 상처가 있는 경우 의료 서비스 제공자와 상담하십시오. 의료 서비스 제공자를 찾는 데 도움이 필요하다면 **311**번이나 844-692-4692 번으로 전화하십시오.