



Ouvriers avicoles : Protégez-vous contre la grippe aviaire

La grippe aviaire (également connue sous le nom d'« influenza aviaire ») peut se propager parmi la volaille telle que les poulets, les dindes et les canards. Le virus H5N1 tue la plus grande partie de la volaille infectée.

La grippe aviaire, y compris le virus H5N1, peut se transmettre aux animaux et aux humains lorsqu'ils touchent des excréments ou d'autres fluides corporels d'oiseaux infectés.

Vous risquez de contracter la grippe aviaire car vous travaillez avec de la volaille.

Précautions à prendre

Portez un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de volaille malade ou morte.



Lunettes de sécurité ou écran facial



Masque N95




Couvre-chef ou couvre-cheveux



Gants



Chaussures et couvre-chaussures



Salopette
imperméable



Tablier
imperméable

Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de mettre et après avoir retiré votre EPI.

Lavez vos vêtements et désinfectez vos chaussures après avoir manipulé de la volaille.

Symptômes de la grippe aviaire chez les humains



Yeux rouges, irrités
ou larmoyants



Toux



Mal de gorge



Nez qui coule ou
nez bouché



Fièvre ou
frissons




Douleurs
musculaires
ou corporelles



Maux de tête



Fatigue



Difficultés
à respirer



Diarrhée

Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes après avoir manipulé de la volaille malade ou morte, consultez votre prestataire de soins de santé ou appelez le Département de la santé de la ville de New York au 347-665-0209. Des traitements sont disponibles.

Si vous voulez recevoir de l'aide pour trouver un prestataire de soins, quel que soit votre statut d'immigration ou d'assurance, appelez le 311 ou le 844-692-4692.



Pour obtenir davantage d'informations, consultez nyc.gov/health/birdflu ou scannez le code QR.

NYC
Health

12.25 French