

מענטשן וועלכע ארבעטן מיט פויגל פלייש: באשיצט אייך קעגן פויגל פלו



פויגל פלו, אריינגערעכנט H5N1, קען זיך אויך פארשפרייטן צו חיות און מענטשן ווען זיי רירן אן צואה אדער אנדערע קערפער פליסיגקייטן פון קראנקע פויגלעך.

פויגל פלו (אויך באקאנט אלץ אוויען אינפלוענזע) קען זיך פארשפרייטן צווישן פויגלעך אזויווי הינער, אינדיג און קאטשקעס. די H5N1 סטרעין הרג'עט רוב אנגעשטעקטע פויגלעך.

איר זענט אין געפאר פון כאפן די פויגל פלו וויבאלד איר ארבעט מיט פויגלעך.

נעמט זיכערהייט מאסנאמען

טראגט פערזענליכע שיצונג געצייג (personal protective equipment, PPE) ווען איר ארבעט מיט קראנקע אדער טויטע פויגלעך.



קאפ צודעק אדער האר צודעק



N95 מאסקע



זיכערהייט גלעזער אדער פנים פאנצער



שירצל וואס באשיצט קעגן וואסער



קליידער וועלכע באשיצן קעגן וואסער



שיך און שיך צודעק



הענטשור

וואשט אייערע קליידער און רייניגט אייערע שיך נאכ'ן ארבעטן מיט פויגלעך.

וואשט אלעמאל גוט אפ אייערע הענט מיט זייך און וואסער איידער'ן אנטון אדער אויסטון PPE.

סימפטאמען פון פויגל פלו אין מענטשן



פיבער אדער טרייסלונגען



רינעדיגע אדער פארשטאפטע נאז



האלז וויי



היסן



רויטע, ציפעדיגע אדער רינעדיגע אויגן



דייעריע



אטעמען פראבלעמען



מידקייט



קאפוויי



מוסקל אדער קערפער ווייטאגן

אויב איר האט סיי וועלכע פון די סימפטאמען נאכ'ן ארבעטן מיט קראנקע אדער טויטע פויגלעך, זאלט איר גיין צו אייער העלט קעיר פראוויידער אדער רופן די ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט אויף 347-665-0209. מען קען באקומען באהאנדלונג.

פאר הילף מיט'ן טרעפן א דאקטער, אפגעזען פון אייער אימיגראציע אדער אינשורענס סטאטוס, רופט 311 אדער 844-692-4692.

