

Se protéger et protéger les autres contre la MPV



N'ayez pas de rapports sexuels ou d'autres contacts intimes si vous, ou vos partenaires, constatez l'apparition d'éruptions cutanées ou de lésions, vous sentez malades, ou avez été récemment exposés à la variole du singe (monkeypox, MPV). Demandez à vos partenaires s'ils ont les symptômes de la MPV ainsi que leurs antécédents sexuels récents.



Lavez-vous les mains de manière régulière et lavez également vos draps, serviettes et autres objets que vous partagez à plusieurs. Les sextoys doivent être lavés après chaque utilisation.



Faites-vous vacciner si vous avez été exposé à la MPV ou êtes susceptible de l'être. Il est recommandé de faire deux injections. Pour trouver un centre de vaccination, consultez le site [nyc.gov/vaccinefinder](https://www.nyc.gov/vaccinefinder). Vous pouvez vous faire vacciner sans rendez-vous dans les centres gérés par la ville de New York.



Si vous présentez des symptômes de la MPV, consultez votre prestataire de soins de santé pour vous faire dépister et connaître les options en matière de gestion de la douleur ou de traitement. Si vous n'avez pas de prestataire de soins de santé, appelez le **311** pour savoir comment obtenir des soins.

Pour obtenir davantage d'informations, consultez le site [nyc.gov/mpv](https://www.nyc.gov/mpv) ou scannez le code QR. Envoyez « MONKEYPOX » par SMS au 692 692 pour recevoir des alertes.

