

COVID-19 居家檢測

COVID-19 居家檢測讓您得以自我檢測，並在幾分鐘內即獲得檢測結果。

居家檢測操作小貼士

- 進行檢測之前，請仔細閱讀使用說明，並觀看所有相關教學影片。
- 檢測前後均須洗手，並對檢測中使用的桌子或其他表面進行消毒。
- 請在檢測試劑盒說明中寫明的時段內，讀取檢測結果。在規定時段之前或之後讀取結果，均可能失準。
- 切勿重複使用檢測試劑盒或組件。切勿使用損壞或變色的檢測組件。

檢測結果解讀

- 如果您最近感染過 COVID-19，或是出現過無症狀感染，居家檢測有可能會偵測不到 COVID-19。這可以導致即便您已感染了 COVID-19，檢測結果卻仍呈陰性的情況。
- 如果您的檢測結果為**陽性**：
 - 您極有可能已經感染了 COVID-19，因此無需再進行額外檢測。
 - 請居家隔離**至少五天整**（第一天是出現症狀之後的那一天，或者如果未出現症狀，則以完成 COVID-19 檢測之後的那一天為準）。請遵循美國疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention) 有關何時可以解除隔離的指導（可登錄 bit.ly/cdc-covid-isolation 查看）。請在 10 天內，在與他人共處時戴好口罩，並採取其他預防措施。請通知密切接觸者，以便他們可以接受檢測。請聯繫您的健康照護提供者或致電 212-268-4319，瞭解或尋求治療選項。
- 如果檢測結果為**陰性**，同時您：
 - 已出現 COVID-19 症狀，請務必繼續隔離，並在 48 小時後再次進行檢測
 - 未出現 COVID-19 症狀，但認為自己曾接觸 COVID-19 病毒，請務必在 48 小時後再次檢測。如果您的二次檢測結果仍為陰性，請在 48 小時後再進行第三次檢測（總共三次檢測）。
- 進行多次檢測時，無需使用相同品牌的檢測試劑盒。
- 如果您任何一次後續檢測的結果為陽性，您可能已經感染 COVID-19，因此需要隔離。如果您的連續檢測結果均為陰性，但您認為自己可能已感染 COVID-19，請聯繫您的健康照護提供者，或進行分子 (PCR) 檢測。

其他資源

- 瞭解自身已感染 COVID-19 時，如何保護自己和他人的相關資訊，請造訪 nyc.gov/health/coronavirus 並點擊「When You Are Sick」（如果您感到不適）。
- 瞭解 COVID-19 的治療資訊，請造訪 nyc.gov/health/covidtreatments。治療越早開始，效果越好。因此如果您檢測結果呈陽性，請立即致電您的健康照護提供者。
- 瞭解您或您的孩子感染 COVID-19 後，如何獲得病假的相關資訊，請造訪 paidfamilyleave.ny.gov/covid19。

- 如需查找 COVID-19 檢測站點（部分站點提供免費檢測），請造訪 nyc.gov/covidtest。如需瞭解何處可得免費居家檢測試劑盒的資訊，請造訪 nyc.gov/coronavirus 並點擊「Get Tested」（接受檢測）。
- 獲取 COVID-19 檢測的更多資訊，包括介紹居家檢測如何操作的影片連結，請造訪 nyc.gov/health/testingtips 或掃描此 QR 碼。

紐約市衛生局或順應形勢發展而調整建議。

10.7.22 Traditional Chinese