

## COVID-19 백신 추가 접종 vs. 부스터 접종

	면역 저하 환자를 위한 추가 접종	부스터 접종이란
무엇입니까?	이전에 COVID-19 백신 접종을 받았으나 충분히 강력한 반응을 보이지 않은 사람들을 위한 추가 접종	추가 보호력을 제공하기 위한 추가 백신 접종입니다.
누가 접종 대상자입니까?	중등도에서 심각한 수준의 면역 저하가 있는 5 세 이상의 주민	만 12 세 이상 주민
왜 접종해야 합니까?	일부 면역력이 저하된 사람은 면역력에 문제가 없는 사람과 비교해 백신 반응성이 낮습니다. 3 차 접종은 면역 반응을 개선할 수 있습니다.	백신은 심각한 질환의 발병을 효과적으로 막아줄 수 있는 반면, 중등도에서 중증 감염에 대한 보호력은 시간이 지나면서 약화될 수 있습니다.
어떤 백신 브랜드?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pfizer 또는 Moderna 백신을 접종한 경우, 가능하면 첫 2 회 접종한 백신과 동일한 브랜드를 접종합니다.</li> <li>Johnson &amp; Johnson 백신이나 다른 백신을 접종한 경우, Pfizer 또는 Moderna 백신을 접종합니다.</li> </ul>	최초 접종 백신 브랜드와 동일하거나 다른 브랜드. Pfizer 및 Moderna 백신이 선호됩니다.
언제부터 접종 대상입니까?	Pfizer 또는 Moderna 백신의 2 회차 접종으로부터, 또는 Johnson & Johnson 백신 1 회 접종으로부터 최소 28 일 이후.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pfizer 또는 Moderna</b> 백신을 접종한 경우, 2 회차 접종으로부터 최소 5 개월 이상(또는, 중등도에서 심각한 수준의 면역 저하자인 경우 추가 접종으로부터 최소 3 개월 이후).</li> <li><b>Johnson &amp; Johnson</b> 백신을 접종했다면, 접종으로부터 최소 2 개월 이후.</li> </ul>
어떤 서류가 필요합니까?	연령 증빙 해당하는 질환이 있음을 증빙해야 합니다. 백신 카드가 있는 경우, 지참하십시오.	연령 증빙 백신 카드가 있는 경우, 지참하십시오.
부작용이 있습니까?	팔 욱신거림, 두통, 몸살, 피곤함 및 발열과 같은 부작용을 겪을 수 있습니다.	팔 욱신거림, 두통, 몸살, 피곤함 및 발열과 같은 부작용을 겪을 수 있습니다.
무료입니까?	응.	응.
어디서 자세한 내용을 확인할 수 있습니까?	<a href="https://on.nyc.gov/additionaldose">on.nyc.gov/additionaldose</a> 을 확인하십시오.	<a href="https://on.nyc.gov/vaccinefacts">on.nyc.gov/vaccinefacts</a> 을 확인하십시오.

백신 접종소를 찾으려면, [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) 를 방문하거나 877-829-4692 번으로 전화하시기 바랍니다. 더 자세한 정보는 [nyc.gov/covidvaccine](https://nyc.gov/covidvaccine) 를 방문하십시오.

NYC 보건부에서는 상황이 진전됨에 따라 권장 사항을 변경할 수 있습니다.

3.15.22