

بادر بتلقي الجرعات التنشيطية المحدثة ضد مرض (COVID-19) ولقاح الإنفلونزا اليوم!

يوصي بتلقي لقاحات الإنفلونزا المتوفرة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر، والجرعة التنشيطية الجديدة للقاح (COVID-19) المتوفرة للأشخاص بدءًا من عمر 5 سنوات فأكثر في أقرب وقت ممكن. ينبغي لك الحصول على لجرعة التنشيطية الجديدة للقاح (COVID-19) للوقاية من متحورات أو ميكرون الجديدة، إذا كنت قد تلقيت جرعة من لقاح (COVID-19) قبل شهرين على الأقل.

هل يمكنني الحصول على الجرعة التنشيطية الجديدة لمرض (COVID-19) ولقاح الإنفلونزا معًا؟
نعم. يمكنك تلقي اللقاحين معًا أو الحصول على كل لقاح على حدة.

هل من الممكن الحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من مرض (COVID-19) في حالة إصابتي بمرض (COVID-19) مؤخرًا؟

نعم، لكن يُنصح بالانتظار لمدة ثلاثة أشهر بعد الإصابة بمرض (COVID-19). يُوصى بالحصول على الجرعة التنشيطية في أقرب وقت إذا كنت أنت أو أhabؤك معرضون لخطر أكبر للتعرض لمرض (COVID-19) أو لمضاعفات حادة له. وإذا كانت لديك أية أسئلة، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية، أو اتصل بالرقم 311 إذا لم يكن هناك مقدم رعاية صحية تتعامل معه.

ما نوع الجرعة التنشيطية التي ينبغي لي أخذها للوقاية من مرض (COVID-19)؟

يمكن الحصول على جرعة Pfizer التنشيطية المحدثة (إذا كان عمر الشخص 5 سنوات أو أكثر) أو جرعة Moderna التنشيطية المحدثة (إذا كان عمر الشخص 6 سنوات أو أكثر)، بصرف النظر عن نوع اللقاح الذي حصلت عليه سابقًا.



للعثور على موقع للحصول على اللقاح، تفضل بزيارة nyc.gov/vaccinefinder أو اتصل بالرقم 877-829-4692 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة nyc.gov/health/flu أو nyc.gov/health/covidvaccine.

