


Les données de surveillance de la Ville de New York concernant le VIH sont utilisées pour planifier et mettre en œuvre la prévention, le dépistage et les initiatives de traitement du VIH, et ce, afin de pouvoir améliorer la santé des New-Yorkais. En 2024, le nombre de personnes récemment diagnostiquées séropositives (1 791) a augmenté de 5,4 % par rapport à 2023. Les données montrant les augmentations et les inégalités dans les nouveaux diagnostics ainsi que l'incidence estimée soulignent la nécessité d'une réponse de santé publique soutenue, voire accélérée, face au VIH.




1 791 personnes ont été récemment diagnostiquées séropositives à NYC en 2024, soit une hausse de **5,4 %** par rapport à 2023.

Proportion de personnes récemment diagnostiquées séropositives à NYC par race et origine ethnique





Proportion de la population de NYC par race et origine ethnique




85 % des personnes récemment diagnostiquées séropositives étaient **noires** ou **latinas**¹, cependant ces groupes ne représentent que **50 % de la population de NYC**.

Parmi les personnes récemment diagnostiquées séropositives :




96 % avaient probablement contracté le VIH lors d'un **contact sexuel** et **3 %** ont indiqué **des antécédents de consommation de drogues injectables**^{3,4}




65 % étaient des **hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes**^{3,4}

On estime à **91 300** le nombre de personnes séropositives vivant à NYC en 2024.

Sur 100 personnes séropositives à NYC :



La **suppression virale**⁵ parmi les personnes séropositives variait en fonction de la race ou de l'origine ethnique¹.



Les informations et ressources sur la prévention, le dépistage, et le traitement du VIH sont disponibles à NYC.

Prévention

Outre les préservatifs et autres méthodes barrières, il existe des médicaments sûrs et efficaces mis à la disposition de tous pour prévenir le VIH.

- La prophylaxie pré-exposition (pre-exposure prophylaxis, PrEP) prévient le VIH à l'avance.
- La prophylaxie post-exposition (post-exposure prophylaxis, PEP) est un traitement d'urgence qui peut prévenir une nouvelle infection causée par le VIH si elle est prise rapidement après une exposition.

Dépistage

Vous pouvez trouver des dépistages VIH gratuits ou à faible coût près de chez vous en :

- vous rendant dans une clinique de santé sexuelle de NYC, où toute personne de 12 ans ou plus peut passer un test de dépistage anonyme et confidentiel : nyc.gov/sexualhealthclinics ;
- faisant une recherche sur la carte NYC Health : nyc.gov/health/map ;
- envoyant « TESTNYC » par SMS au 55676 ;
- appelant le **311**.
- Pour obtenir de l'aide concernant la notification à un(e) partenaire, appelez le **311**.

Traitement

Les médicaments pour traiter le VIH sont sûrs et plus efficaces que jamais.

- Indétectable = Intransmissible (Undetectable = Untransmittable, U=U) : Les personnes séropositives qui suivent un traitement et maintiennent une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le VIH durant un rapport sexuel.

Remarque : Données transmises au Département de la santé de NYC le 31 mars 2025. Pour obtenir des informations sur les données et les définitions, et pour consulter le rapport annuel de surveillance du VIH 2024 dans son intégralité, rendez-vous sur nyc.gov/hivreports. ¹ Les catégories raciales excluent l'origine ethnique latina ; les personnes ayant une origine ethnique latina sont regroupées dans la catégorie « Latino/as » quelle que soit leur classification raciale. ² Les autres identités de genre comprennent les personnes non binaires, queers, non conformes au genre, et toute autre identité de genre non mentionnée précédemment. Les identités de genre sont basées sur des données de surveillance du VIH limitées et sont répertoriées sans hiérarchie ni priorisation. ³ Les pourcentages excluent les personnes avec des informations de transmission manquantes (n = 582). ⁴ Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes excluent les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des antécédents de consommation de drogues injectables. ⁵ Les personnes qui avaient une charge virale indétectable (une charge virale inférieure à 200 copies par millilitre) lors de leur dernier test en 2024 étaient considérées comme ayant une charge virale supprimée.



Pour obtenir davantage d'informations et de ressources sur le VIH à NYC, scannez le code QR ou consultez nyc.gov/health/hiv.
Pour obtenir davantage d'informations et de ressources sur les infections sexuellement transmissibles (IST), consultez nyc.gov/sti.