


I dati sulla sorveglianza dell'HIV relativi alla Città di New York vengono utilizzati per pianificare e attuare iniziative di prevenzione, test e trattamento dell'HIV finalizzate al miglioramento della salute dei newyorkesi. Nel 2024 il numero di persone con nuova diagnosi di HIV (1.791) è aumentato del 5,4% rispetto al 2023. I dati evidenziano un aumento di casi e disparità a livello di diagnosi e di incidenza stimata e sottolineano la necessità di interventi concreti, e quanto più rapidi possibili, nei confronti dell'HIV da parte della sanità pubblica.




Nel 2024 a NYC **1.791** persone hanno ricevuto una nuova diagnosi di HIV, dato in aumento del **5,4%** rispetto al 2023.

Percentuale di persone di NYC con nuova diagnosi di HIV distinte per razza o etnia



Percentuale di popolazione di NYC distinte per razza o etnia



L'85% delle persone con nuova diagnosi di HIV erano nere o latine,¹ ma questi gruppi rappresentano solo il 50% della popolazione di NYC.

Tra le **persone con nuova diagnosi di HIV:**



75% erano uomini

20% erano donne


4% erano donne transgender

Meno dell'1% erano uomini transgender

Meno dell'1% avevano altre identità di genere²




96% probabilmente ha contratto l'HIV tramite **rapporti sessuali** e il **3%** ha riferito **una storia d'uso di droghe iniettabili**^{3,4}




65% erano **uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini**^{3,4}

Si stima che nel 2024 a NYC vi fossero **91.300** persone affette da HIV.

Su 100 persone con HIV a NYC:



Soppressione virale⁵ in persone affette da HIV distinte per razza o etnia.¹



A NYC sono disponibili informazioni e risorse su prevenzione, test e trattamento dell'HIV.

Prevenzione

Oltre ai preservativi e ad altri metodi barriera esistono farmaci sicuri ed efficaci che chiunque può assumere per prevenire l'HIV.

- La profilassi pre-esposizione (pre-exposure prophylaxis, PrEP) previene l'HIV.
- La profilassi post-esposizione (post-exposure prophylaxis, PEP) è un farmaco d'emergenza che - se assunto subito dopo essere venuti a contatto con il virus - è in grado di prevenire una nuova infezione da HIV.

Test

Per trovare i centri che eseguono il test per l'HIV gratuitamente o a basso costo vicino a casa:

- Visitare una Clinica per la salute sessuale di NYC, dove chiunque abbia compiuto 12 anni può sottoporsi al test in modo riservato e anonimo: nyc.gov/sexualhealthclinics
- Cercare sulla Mappa di NYC Health: nyc.gov/health/map
- Inviare il messaggio di testo "TESTNYC" al numero 55676
- Chiamare il **311**
- Per essere assistiti nella fase di comunicazione al partner chiamare il **311**.

Trattamento

I farmaci per il trattamento dell'HIV sono sempre più sicuri ed efficaci.

- Non rilevabile = Non trasmissibile (Undetectable = Untrasmissibile, U=U): le persone con HIV che sono in cura e mantengono una carica virale al di sotto della soglia di rilevabilità non possono trasmettere l'HIV attraverso i rapporti sessuali.

Nota: I dati comunicati al Dipartimento della salute di NYC (NYC Health Department) sono riferiti al 31 marzo 2025. Per informazioni su dati e definizioni e per consultare il Rapporto annuale completo sulla sorveglianza dell'HIV del 2024 visitare nyc.gov/hivreports.

¹Le categorie razziali escludono l'etnia latina; le persone di etnia latina sono raggruppate nella categoria Latina indipendentemente dalla classificazione razziale. ²Con altre identità di genere s'intendono non-binaria, genderqueer, di genere non conforme e qualsiasi identità di genere non elencata in precedenza. Le identità di genere si basano su dati limitati relativi alla sorveglianza dell'HIV e sono riportate senza gerarchia o priorità intenzionale. ³Le percentuali non tengono conto di persone di cui non si conoscono i dati relativi alla trasmissione del contagio (n = 582). ⁴Dal numero di uomini che hanno rapporti sessuali con uomini sono esclusi quelli che hanno anche una storia d'uso di droghe iniettabili. ⁵Le persone con una carica virale non rilevabile (carica virale inferiore a 200 copie per millilitro) nell'ultimo test del 2024 sono state considerate in soppressione virale.



Per ulteriori informazioni e risorse sull'HIV a NYC inquadrare il QR code o visitare nyc.gov/health/hiv. Per ulteriori informazioni e risorse sulle infezioni sessualmente trasmesse (Sexually Transmitted Infection, STI) visitare nyc.gov/sti.