


Dane z nadzoru nad HIV miasta Nowy Jork służą do planowania i wdrażania inicjatyw związanych z HIV — zapobiegania, testowania i leczenia — w celu poprawy stanu zdrowia Nowojorczyków. W 2024 roku liczba osób, u których niedawno zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV (1791), wzrosła o 5,4% w porównaniu z rokiem 2023. Dane wykazujące wzrost i nierówności w zakresie nowych diagnoz oraz szacowanej zapadalności podkreślają potrzebę dalszej, a nawet przyspieszonej reakcji na problem HIV pod kątem ochrony zdrowia publicznego.


HIV w mieście Nowy Jork 2024

W 2024 roku w mieście Nowy Jork zdiagnozowano **1791** nowych przypadków zakażenia wirusem HIV, co oznacza wzrost o **5,4%** w porównaniu z rokiem 2023.

Proporcja osób, u których niedawno zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV, według rasy i pochodzenia etnicznego





Proporcja populacji miasta Nowy Jork według rasy i pochodzenia etnicznego




85% osób, u których niedawno zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV, było czarnoskórymi lub Latynosami¹, podczas gdy grupy te stanowiły zaledwie 50% populacji miasta Nowy Jork.

Wśród osób z niedawno zdiagnozowanym zakażeniem wirusem HIV:




96% prawdopodobnie zaraziło się wirusem HIV przez **kontakt seksualny**, a **3%** zgłosiło **historię wstrzykiwania narkotyków^{3,4}**




65% stanowili **mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami^{3,4}**

Szacuje się, że w 2024 roku w Nowym Jorku żyło około **91 300** osób zakażonych wirusem HIV.

Spośród 100 osób zakażonych wirusem HIV w mieście Nowy Jork:



Supresja wirerii⁵ wśród osób zakażonych wirusem HIV różniła się w zależności od rasy i pochodzenia etnicznego¹.



W mieście Nowy Jork są dostępne informacje i zasoby dotyczące zapobiegania, testowania i leczenia HIV.

Zapobieganie

Oprócz prezerwatyw i innych metod barierowych istnieją bezpieczne i skuteczne leki zapobiegające zakażeniu wirusem HIV u wszystkich osób.

- Profilaktyka przedekspozycyjna (pre-exposure prophylaxis, PrEP) zapobiega zakażeniu wirusem HIV z wyprzedzeniem.
- Profilaktyka poekspozycyjna (post-exposure prophylaxis, PEP) to leczenie w sytuacjach nagłych, które może zapobiec nowemu zakażeniu wirusem HIV, jeśli zostanie podjęte wkrótce po narażeniu.

Testy

Tanie lub bezpłatne badania pod kątem wirusa HIV można uzyskać:

- W przychodni zdrowia seksualnego w mieście Nowy Jork, gdzie każda osoba w wieku od 12 lat może uzyskać poufny, anonimowy test: **nyc.gov/sexualhealthclinics**
- Wyszukując na mapie NYC Health: **nyc.gov/health/map**
- Wysyłając SMS o treści „TESTNYC” pod numer 55676
- Dzwoniąc pod numer **311**
- Aby uzyskać pomoc w sprawie powiadomienia partnera, można zadzwonić pod numer **311**.

Leczenie

Leki stosowane w leczeniu HIV są bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

- „Niewykrywalny = niezaraźliwy” (undetectable = untransmittable, U=U): Osoby zakażone wirusem HIV, które przechodzą leczenie i u których miano wirusa pozostaje niewykrywalne, nie mogą przenosić wirusa HIV drogą płciową.

Uwaga: Z danych zgłoszonych do Wydziału Zdrowia miasta Nowy Jork według stanu z 31 marca 2025 r. Aby uzyskać informacje o danych i definicjach, a także zapoznać się z pełnym Sprawozdaniem rocznym z nadzoru nad HIV z 2024 roku, odwiedź stronę **nyc.gov/hivreports**.
¹Kategorie rasowe nie obejmują pochodzenia etnicznego Latynosów; osoby należące do tej grupy etnicznej są zaliczane do kategorii Latynosi bez względu na ich przynależność rasową. ²Inne tożsamości płciowe obejmują osoby niebinarne, queerowe, nieprzystające do płci oraz wszelkie tożsamości płciowe, które nie zostały wcześniej wymienione. Tożsamości płciowe opierają się na ograniczonych danych z monitorowania HIV i są wymienione bez jakiegokolwiek zamierzonej hierarchii lub priorytetyzacji. ³Dane procentowe nie uwzględniają osób, w których przypadku informacje o przeniesieniu wirusa są nieznane (n = 582). ⁴Kategoria mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami nie obejmuje mężczyzn, którzy uprawiali seks z mężczyznami i mają historię wstrzykiwania narkotyków. ⁵Osoby, u których w ostatnim badaniu w 2024 r. nie wykryto wirerii (miano wirusa mniejsze niż 200 kopii na mililitr), uznano za osoby z supresją wirusa.



W celu uzyskania dodatkowych informacji i zasobów dotyczących HIV w mieście Nowy Jork zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę **nyc.gov/health/hiv**.
W celu uzyskania dodatkowych informacji i zasobów na temat infekcji przenoszonych drogą płciową (sexually transmitted infections, STI) odwiedź stronę **nyc.gov/sti**.