


Данные эпидемиологического надзора за ВИЧ в г. Нью-Йорке используются для планирования и реализации инициатив по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ с целью улучшения здоровья ньюйоркцев. Согласно данным за 2024 г. количество лиц, которым впервые диагностировали ВИЧ (1791), выросло на 5,4 % по сравнению с показателем за 2023 г. Данные показали увеличение и непропорциональность количества лиц, у которых ВИЧ был диагностирован впервые, и оценочная частота случаев подчеркивает необходимость принятия срочных и стабильных мер контроля ВИЧ со стороны общественного здравоохранения.


# ВИЧ в NYC в 2024 г.

**1791** лицу был впервые поставлен диагноз ВИЧ в NYC в 2024 г. — этот показатель увеличился на **5,4 %** по сравнению с 2023 г.

Доля лиц в NYC, которым впервые диагностировали ВИЧ, по расовой и этнической принадлежности



Доля населения NYC по расовой и этнической принадлежности



**85 % лиц, которым был впервые поставлен диагноз ВИЧ, были афроамериканцами или латиноамериканцами,<sup>1</sup> однако эти группы составляли всего лишь **50 % населения NYC.****

Среди лиц, которым впервые поставлен диагноз ВИЧ:


**75 %** были мужчинами

**20 %** были женщинами


**4 %** были трансгендерными женщинами

**Менее 1 %** были трансгендерными мужчинами

**Менее 1 %** имели другие гендерные идентичности<sup>2</sup>



**96 %**, вероятно, заразились ВИЧ **при половом контакте**, а также **3 %** сообщили об **опыте употребления инъекционных наркотиков**<sup>3,4</sup>



**65 %** были **мужчинами**, которые занимались **сексом с мужчинами**<sup>3,4</sup>

По оценкам, в NYC в 2024 г. проживало **91 300** человек с ВИЧ.

Из 100 человек с ВИЧ в NYC:

- 94** был поставлен диагноз
- 87** получили медицинское обслуживание, связанное с ВИЧ
- 83** назначили лекарственные препараты для лечения ВИЧ
- 81** имели подавленную вирусную нагрузку

**Вирусная супрессия<sup>5</sup>** среди лиц с ВИЧ различалась в зависимости от расовой и этнической принадлежности.<sup>1</sup>

- |   |             |
|---|-------------|
| <b>Афроамериканцы</b>                             | <b>77 %</b> |
| <b>Латиноамериканцы</b>                           | <b>81 %</b> |
| <b>Белые</b>                                      | <b>89 %</b> |
| <b>Азиаты или уроженцы островов Тихого океана</b> | <b>83 %</b> |
| <b>Коренные американцы</b>                        | <b>76 %</b> |
| <b>Смешанные расы</b>                             | <b>74 %</b> |

**Примечание.** Данные, представленные в Департамент здравоохранения NYC (NYC Health Department) по состоянию на 31 марта 2025 г. Чтобы ознакомиться с подробными данными и определениями, а также с полным ежегодным отчетом о надзоре за ВИЧ за 2024 г., посетите сайт [nyc.gov/hivreports](https://nyc.gov/hivreports).

<sup>1</sup>Расовые категории не включают латиноамериканскую этническую группу; представители этой этнической группы относятся к категории «латиноамериканцы», независимо от своей расовой классификации. <sup>2</sup>Другие гендерные идентичности включают небинарных персон, гендерквиров, гендерно-некомформных людей и другие гендерные идентичности, не указанные выше. Сведения в отношении гендерных идентичностей основаны на ограниченных собранных данных надзора за ВИЧ и представлены без намеренной иерархии или приоритетности. <sup>3</sup>Процентные показатели не включают лиц с неизвестной информацией о способе передачи (n = 582). <sup>4</sup>Данные о мужчинах, занимающихся сексом с мужчинами, не включают тех мужчин, у кого был опыт употребления инъекционных наркотиков.

<sup>5</sup>Лица с неопределенной вирусной нагрузкой (вирусная нагрузка менее 200 копий на миллилитр) при последнем тестировании в 2024 г. считались лицами с подавленной вирусной нагрузкой.



Для получения дополнительной информации и материалов о ВИЧ в NYC отсканируйте QR-код или посетите сайт [nyc.gov/health/hiv](https://nyc.gov/health/hiv).

Для получения дополнительной информации и материалов об ИППП посетите сайт [nyc.gov/sti](https://nyc.gov/sti).